

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

**โอลาราทูแมบ**  
**10 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร**  
**ชนิด สารละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อทางการค้า คือ ลาร์ทรูโว**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**  
 ยานี้มีชื่อสามัญว่า โอลาราทูแมบ (olaratumab)
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**  
 ยานี้ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนในกรณีที่แพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**  
 เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**
- **ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี** เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอายุนี
  - **ถ้าคุณกำลังได้รับการรักษาโรคหัวใจหรือโรคตับ** คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพราะอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่ใช้ร่วมกับยานี้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**3. วิธีใช้ยา**

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ให้ในวันที่ **1 และวันที่ 8** ของแต่ละรอบการรักษาแบบ 3 สัปดาห์
  - ยานี้จะให้โดยการหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ **นานประมาณ 60 นาที**
- 3.2 หากลืมไปฉีดยาควรทำอย่างไร**
- **ให้ท่านติดต่อแพทย์โดยด่วน** เพื่อปรับตารางการให้ยาใหม่
- 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด **หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันที**

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตามอาการหรืออันตรายจากการใช้ยา
- **ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์** ในขณะที่ได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย **3 เดือน** หลังได้รับยานี้ครั้งสุดท้าย เนื่องจากยานี้อาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์
- **ควรสอบถามแพทย์ของท่านว่าท่านสามารถให้นมบุตรในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยานี้ได้หรือไม่** เพราะยังไม่ทราบว่ายานี้ขับออกทางน้ำนมหรือเป็นอันตรายต่อ ทารกที่ดื่มนมแม่หรือไม่

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

- 5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการดังต่อไปนี้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
  - มีไข้ หนาวสั่น
- 5.2 อาการที่เหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการให้ยาได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ภาวะเลือดออก อาจมีอาการเหนื่อยมาก อ่อนเพลีย เวียนหัว หรืออุจจาระเปลี่ยนเป็นสีดำ
  - คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหรือเจ็บในปากหรือในลำคอ ท้องเสีย ปวดหัว

**6. การเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง
- ควรเก็บที่อุณหภูมิ **2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง**
- ห้ามเขย่าขวดยา

ผู้นำเข้าบริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย)  
 เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561