

**พิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแอม**  
**ความแรง 4 กรัม/0.5 กรัม**  
**ชนิดฉีด**  
**ชื่อการค้า PERATAM FOR**  
**INJECTION (4.5 G)**  
**(เพอราแอม ชนิดฉีด (4.5 กรัม))**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อว่าพิเพอราซิลลินโซเดียมและทาโซแบ็กแอมโซเดียม (piperacillin sodium/ tazobactam sodium) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลินผสมกับยาต้านเอนไซม์เบตาแล็กตามเอส

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงที่ไวต่อยานี้ ได้แก่

- ติดเชื้อภายในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสบ เยื่อช่องท้องอักเสบ
- ติดเชื้อในท่อทางเดินน้ำดี
- ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
- ติดเชื้อที่ผิวหนัง
- ติดเชื้อในเลือด
- ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- มีไข้และตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลลิน กลุ่มเซฟาโลสปอริน หรือยาอื่นในกลุ่มเบตาแล็กตาม

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- มีประวัติการแพ้ยาหลายชนิด
- มีอาการผื่นแดง ระบายท้องหรือบวม
- ท้องร่วง
- โรคไตบกพร่อง หรือกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
- ต้องจำกัดเกลือโซเดียม
- เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง

⊗ *ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด* เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น

- ยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิด เช่น เวคูโรเนียม
- ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟารินโซเดียม
- ยาเมโทเทริกเซดซึ่งใช้รักษามะเร็ง โรคมะเร็ง และเรื้อนกวาง
- ยาโพเรนเนซิดซึ่งใช้รักษาโรคเกาต์
- ยาด้านเชื้อแบคทีเรียอื่นบางชนิด เช่น แวนโคไมซิน ยาเทระไซคลิน

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล

**3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ให้รับยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์เพื่อหยุดยาหรือหากเกิดอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาลต้องรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาเหลือง ตัวเหลือง
- ท้องร่วงรุนแรง ร่วมกับมีไข้ หรืออ่อนเพลีย
- ปัสสาวะมีสีแดง หรือน้ำตาล
- เลือดกำเดาไหล มีรอยฟกช้ำ
- ชัก

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล**

- ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
- แผลในปาก
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
- ความดันเลือดต่ำ
- ปวด บวม หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- ยานี้จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

ผงยาปราศจากเชื้อสีขาวถึงเกือบขาว ประกอบด้วย Piperacillin sodium และ Tazobactam sodium

**ผู้ผลิต**

บริษัท สยามเภสัช จำกัด  
123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย  
และเลขที่ 9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย  
ผู้แทนจำหน่าย  
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลล จำกัด  
171/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย  
โทร. 02-6259999  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ (04/04/2019)

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**