

แบเรียมซัลเฟต

ความแรง 6 กรัมต่อขวด ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดผงแห้ง ชื่อการค้า Barimac (แบริแมค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า แบเรียมซัลเฟต (barium sulfate) ซึ่งเมื่อผสมแล้วจะได้ยาน้ำแขวนตะกอนที่มีแบเรียมซัลเฟต 30 กรัมใน 100 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มที่รังสีที่ใช้ในการเอกเรย์วินิจฉัยโรค

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในการตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่สำลักง่าย
- ผู้ที่มีทางเดินอาหารอุดตัน
- ผู้ที่มีทางเดินอาหารทะลุ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยาหากท่านเป็นโรคความดันเลือดสูงหรือโรคหัวใจ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายได้
- หากท่านเคยสำลักอาหารหรือมีปัญหาการกลืน ให้ค่อยๆ กลืนยาอย่างระมัดระวัง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- ให้กินยาหลังอาหารมื้อละ 1 ขวด
- ให้ผสมยาที่ต้องกินในแต่ละมื้อ อย่างผสมทิ้งไว้
- วิธีการผสมยา
 - เขย่าขวดยาเพื่อให้ผงยาในขวดร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน
 - รินน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำสะอาดลงในกระบอกตวง 20 มิลลิลิตร
 - เติมน้ำจากกระบอกตวงลงไปในช่วงประมาณครึ่งขวด หรือพอท่วมผงยา
 - เขย่าให้ยากระจายตัวทั่ว ไม่มีก้อนแข็ง
 - เติมน้ำส่วนที่เหลือและเขย่าอีกครั้ง
 - ดื่มน้ำตามมากๆ หลังรับประทานยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในระหว่างวันควรดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะลำไส้อาจอุดตันจากการใช้ยานี้
- หลังผสมยานี้ให้ใช้ทันที และทิ้งยาส่วนที่ไม่ใช้แล้ว
- หากมีอาการท้องผูกมากหลังกินยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- “หากมีอาการข้างต้นหรืออาการผิดปกติอื่นๆ ที่รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดเกร็งที่ท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว และห้ามแช่แข็ง
- หากยังไม่ใช้ยา ห้ามเปิดขวดยาเพราะอาจทำให้ยาเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาแบริแมค เป็นผงสีขาวถึงขาวครีม

ส่วนประกอบ

แต่ละขวด ประกอบด้วยตัวยาแบเรียมซัลเฟต 6 กรัม ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ carboxymethylcellulose sodium, orange durarome, citric acid, aspartame, sodium chloride, sucrose, colloidal silicon dioxide

ผู้ผลิต บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร