

วัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์

ชนิดน้ำแขวนตะกอน

ขนาด 0.5 มิลลิลิตรต่อไซริงค์
VaxigripTetra (วาซิกิริปเตตรา)

1. วัคซีนนี้คือวัคซีนอะไร

1.1 วัคซีนนี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- วัคซีนนี้มีชื่อสามัญว่าวัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์ (quadrivalent influenza vaccine, split virion, inactivated)

1.2 วัคซีนนี้ใช้เพื่ออะไร

- วัคซีนนี้ใช้เพื่อป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
- วัคซีนนี้มีผลป้องกันโรคไขหวัดใหญ่หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ และไม่มีผลในการป้องกันไขหวัดธรรมดา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้วัคซีน

2.1 ห้ามใช้วัคซีนนี้เมื่อไร

- เคยแพ้วัคซีนนี้หรือส่วนประกอบในวัคซีนนี้ เช่น ไข่ เนื้อไก่ นิโอมัยซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือออกโตซินอล-9
- มีไข้สูงหรือกำลังมีอาการป่วย ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนนี้ออกไปจนกว่าจะหายเป็นปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้วัคซีนนี้

- แจ้งแพทย์หากท่านหรือลูกของท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - เกล็ดเลือดต่ำหรือเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติในการหยุดเลือด เนื่องจากการฉีดวัคซีนอาจทำให้เลือดออกได้
 - ภูมิคุ้มกันต่ำหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง
 - เคยวูบหรือเป็นลม ก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีน เนื่องจากกลัวการฉีดยา

- หากท่านตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีนนี้
- วัคซีนนี้อาจไม่ได้ให้ผลป้องกันได้อย่างเต็มที่กับทุกคนที่ได้รับวัคซีน

3. วิธีใช้วัคซีน

3.1 ขนาดและวิธีใช้

แนะนำฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร:

- เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 9 ปี:
 - เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน ให้ ฉีด 1 เข็ม ต่อปี
 - ไม่เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน ให้ฉีดเข็มแรก 1 เข็ม และฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป: ฉีด 1 เข็ม ต่อปี

3.2 หากลืมมารับวัคซีนควรทำอย่างไร

- ให้มาพบแพทย์เพื่อวางแผนในการฉีดวัคซีนใหม่

4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดวัคซีน

- ควรอยู่สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที
- แจ้งแพทย์หากท่านหรือลูกของท่าน ต้องตรวจเลือดหลังจากฉีดวัคซีน เพราะวัคซีนอาจทำให้ผลการตรวจเลือดบางชนิดคลาดเคลื่อนได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากวัคซีน

5.1 อาการที่ต้องรีบแจ้งหรือไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
- มีไข้ รู้สึกไม่สบาย
- มีอาการปวด บวม แดง และผิวหนังแข็งกระด้างบริเวณที่ฉีด

6. ควรเก็บวัคซีนนี้อย่างไร

- ยานี้จะเก็บที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้น ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียส และเก็บไว้ในกล่องบรรจุเดิมเพื่อป้องกันแสง
- ห้ามแช่แข็ง

ผู้ผลิต:

Sanofi Pasteur S.A., Val de Reuil, France republic.

ผู้นำเข้า:

บริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

