

ชื่อสามัญทางยา อเล็กทีนิบ ความแรง 150 (มิลลิกรัม) ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร [k1]

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า อเล็กทีนิบ (Alectinib) เป็นยารักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร [k2]

ยานี้ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์ขนาดเล็กที่มีผลตรวจยืนยันเอแอลเคเป็นบวก และเคยได้รับยาคริโซทีนิบมาก่อนแต่อาการแย่ลง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร [k3]

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เด็กและวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ [k4] หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีปัญหาโรคตับ
- มีปัญหาโรคปอดหรือการหายใจ
- หัวใจเต้นช้า
- ท้องอืดหรือวางแผนที่จะท้อง
- กำลังให้นมลูกหรือวางแผนจะให้นมลูก
- กินยาอื่นอยู่ ทั้งที่ซื้อกินเองและได้จากแพทย์เพื่อรักษาโรคอื่น

หากมีภาวะข้างต้น ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ [k5] ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาตามขนาดที่หมอสั่ง พร้อมมื้ออาหารเช้าและเย็น วันละสองครั้ง
- กินยานี้พร้อมมื้ออาหาร

- ควรกลืนยาแคปซูลทั้งแคปซูล โดยไม่แกะแคปซูลหรือละลายยา
- แพทย์อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาตามอาการของผู้ป่วยและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร [k6]

- หากลืมกินยาและนึกขึ้นได้ก่อนถึงมือถัดไปนานกว่า 6 ชั่วโมงให้กินยาทันทีที่นึกได้
- หากนึกขึ้นได้ก่อนถึงเวลามือถัดไปน้อยกว่า 6 ชั่วโมงไม่ต้องกินยาที่ลืม ให้กินยามือถัดไปตามปกติ

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา [k7]

- หากผู้ป่วยอาเจียนภายหลังจากกินยา ไม่ต้องกินยาซ้ำ ผู้ป่วยควรกินยามือถัดไปตามเวลาที่กำหนด
- หากมีความเสี่ยงที่จะมีลูกต้องทำการคุมกำเนิดระหว่างการรักษาและภายหลังจากหยุดยาอีก 7 วัน สำหรับผู้ป่วยหญิง สำหรับผู้ป่วยชายภายหลังจากหยุดยาอีก 3 เดือน
- ห้ามให้นมลูกระหว่างการรักษาและภายหลังจากหยุดยาอีก 7 วัน
- หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดเป็นระยะเวลานานในขณะที่ได้รับการรักษาด้วยยา และภายหลังจากหยุดยาอีก 7 วัน แนะนำให้ทาครีมกันแดด เอสพีเอฟ 50
- ไม่ควรกินยานี้พร้อมน้ำผลไม้ หรือ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น ส้ม ส้มโอ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- รู้สึกเหนื่อยมาก ออยากอาหารน้อยลง ตัวเหลืองหรือตาเหลือง บัสสาวะมีสีคล้ำ ค้นตามผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องข้างขวา เกิดรอยข้ำ จ้ำเลือดตามตัวง่ายกว่าปกติ

- หายใจไม่ค่อยออก ไอ มีไข้
- รู้สึกหัวใจเต้นช้า เวียนหัว หมดสติ
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อตึงหรืออ่อนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที [k8]

- เหนื่อยง่าย
- ท้องผูก หรือ ท้องเสีย
- บวมที่แขน เท้า ข้อเท้า และเปลือกตา
- คลื่นไส้
- มีผื่นขึ้น
- การมองเห็นผิดปกติ เช่น ภาพเบลอ ภาพซ้อน หากมีอาการอื่นๆ นอกจากนี้และไม่แน่ใจว่าเกิดจากยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร [k9]

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต: บริษัท เอ็กเซลล่า จีเอ็มบีเอช โคแอนด์เคจี ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด, กรุงเทพฯ
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือน กรกฎาคม 2560

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์

[สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จากเอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ]