

มีโพลีซูแมบ

100 มิลลิกรัม



ชนิดยาผงที่ต้องละลายสำหรับฉีด

Nucala (นูกาล่า)

กรุณาอ่านเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยานี้

โปรดเก็บเอกสารกำกับยานี้ไว้ ท่านอาจต้องการอ่านอีกครั้ง

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า มีโพลีซูแมบ (mepolizumab) เป็นยาในกลุ่ม โมโนคลอนอลแอนติบอดี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหืดชนิดรุนแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเหมาะสมในการใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้

โปรดปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลหากคิดว่าท่านแพ้ยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ไม่สามารถควบคุมอาการ โรคหืดได้ หรือมีอาการแย่งระหว่างการรักษาด้วยยานี้
- เคยเกิดอาการแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงบริเวณที่ฉีดยา
- ต้องเดินทางหรืออยู่ในบริเวณที่พบการติดเชื้อพยาธิได้บ่อย
- มีการใช้ยาอื่นเมื่อไม่นานมานี้ กำลังใช้หรือจะเริ่มใช้ยาอื่น
- ไม่ให้ใช้ยานี้หากท่านมีการติดเชื้อพยาธิ ควรได้รับการรักษาให้หายก่อนที่จะเริ่มต้นการรักษาด้วยยานี้
- ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ห้ามหยุดใช้ยาสำหรับรักษาโรคหืดชนิดอื่นในทันทีเมื่อท่านเริ่มใช้ยานี้ การหยุดยาอื่นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ยานี้ควรฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์ครั้งละ 1 เข็มทุก 4 สัปดาห์

3.2 หากไม่ได้รับยาตามกำหนด

ให้ติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันทีเพื่อนัดวันให้ยาใหม่

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับยา ติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากมีอาการ โรคหืดแย่งขณะ ได้รับการฉีดยานี้ รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- รู้สึกอ่อนเพลียหรือเวียนศีรษะกระแทนหัน

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ
- ไอ และมีไข้
- มีเลือดปนในปัสสาวะ เจ็บเวลาปัสสาวะและปัสสาวะบ่อย มีไข้ ปวดหลังส่วนล่าง
- ปวดท้อง หรือรู้สึกอึดอัดบริเวณท้อง
- ปวด แดง บวม คัน และรู้สึกแสบร้อนที่ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดหลัง
- เจ็บคอ
- คัดจมูก

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากมีอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในเอกสารกำกับยานี้

5 ควรเก็บยานี้อย่างไร

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา

เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันที่ยาหมดอายุซึ่งแสดงอยู่บนฉลากและกล่องยา

เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผู้นำเข้า: บริษัท แก๊กล็อกโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:

GPI 05

