




ฉลากพื้น : สีเทาแทนสีของฟอยล์

ตัวอักษร : สีดำ เขียว

ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าจะระบุ Lot No. และ Exp ลงบนฉลากแผงบรรจุยา

ขอรับรองว่าข้อความ “ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม” อยู่ใต้ข้อความคำให้เห็นชัด โดยมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของข้อความที่มีขนาดตัวอักษรใหญ่ที่สุดในฉลากและสีอักษรตัดกับสีพื้น

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

อททพ
นายอนุภาพ เทพสุธรรม

ฉลากแผงบรรจุยา Blister pack แผงละ 10 เม็ด
(ใหม่/ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
ส่วนขยาย 150%

PARACAP®
(PARACETAMOL TABLETS 500 MG)
Contains Paracetamol 500 mg
Relief pain and fever
REG. NO. 1A 15096/67

ยาสามัญประจำบ้าน

PARACAP®
(PARACETAMOL TABLETS 500 MG)
Contains Paracetamol 500 mg
Relief pain and fever
REG. NO. 1A 15096/67

พาราแคป®
ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.
ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม
ลดไข้ บรรเทาปวด
REG. NO. 1A 15096/67



พาราแคป®
ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.
ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม
ลดไข้ บรรเทาปวด
REG. NO. 1A 15096/67

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดและวิธีใช้ยา
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	ครั้งละ 1 เม็ด
มากกว่า 50 ถึง 67	ครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง
มากกว่า 67	ครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง

กินยาห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C



PARA
(PARACETAMOL TA
Contains Paracet
Relief pain a
REG. NO. 1A

พารา
ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พ
ยานี้มีพาราเซตามอล
ลดไข้ บรร
REG. NO. 1A


น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดและวิธีใช้ยา
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	ครั้งละ 1 เม็ด
มากกว่า 50 ถึง 67	ครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง
มากกว่า 67	ครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง

กินยาห่างกัน

คำเตือน

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C



- ฉลากพื้น : สีเขียว เหลือง
- ตัวอักษร : สีขาว ดำ เขียว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
- ขอรับรองว่าข้อความ “ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม” อยู่ใต้ชื่อการค้าให้เห็นชัด โดยมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของข้อความที่มีขนาดตัวอักษรใหญ่ที่สุดในฉลากและสื่อกระดาษติดกับสีพื้น
- ขอรับรองว่าฉลากและเอกสารกำกับยาอยู่บนแผ่นเดียวกันและพื้นที่ของเอกสารกำกับยาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ฉลาก หรือหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด
- ขอรับรองว่าขนาดตัวอักษรของผู้ผลิตเป็น 2 เท่าของผู้แทนจำหน่าย
- ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

อนุภาพ
นายอนุภาพ เทพสุธรรม

00 mm.

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 50 แผง
ส่วนขยายที่ 1 150%

พาราเซท[®]

(ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.)
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Paracetamol 500 mg
สรรพคุณ : ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้ :

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักน้อยกว่า 34	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
น้ำหนักตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

Reg. No. 1A 15096/67

Lot & Control No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสี้นอายุ)



30 mm.

30 mm.

<Description of Labelling>

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 50 แผง
ส่วนขยายที่ 2 180%

พาราเซตามอล®

(ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.)

ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม

ลดไข้ บรรเทาปวด



50x10 Tablets

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 50 แผง
ส่วนขยายที่ 3 150%

PARACAP®

(PARACETAMOL TABLETS 500 MG)

CONTAINS PARACETAMOL 500 mg

RELIEF PAIN AND FEVER

คำเตือน

1. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำ
ในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้
เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกัน
เกิน 5 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพารา-
เซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้
ได้รับยาเกินขนาด
3. ตรวจสอบแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่ม
สุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า
เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง
ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบ
ปรึกษาแพทย์ทันที

สภาวะการเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

ยาสามัญประจำบ้าน

Manufactured by :-

POND CHEMICAL CO., LTD.

1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka,
Pathumthani 12150, Thailand



Distributed by :-

MASALAB CO., LTD.

52 Soi Thakham 14, Samaedam,
Bangkhunthian, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 0-2971-6299 Fax 0-2971-6696
E-mail address : info@masalab.com

พารา

U

(ยานม็ดบ

1. ห้ามใช้ย
- เพราะจะ
2. หลีกเลื
- เพราะอ
3. ปรึกษา
- หรือโรค
4. หากกิน
- หน้ามืด
- ทันที

- ยานี้มีชื่อ
- บรรเทา
- ยานี้ใช้เพ
- ปวดเมือ
- ปวดจาก

- 2.1 ห้ามใช้
- ห้ามใช้
- ห้ามใช้
- เพราะอ
- หลีกเลื
- เพราะอ

x10 Tablets

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 50 แผง
ส่วนขยายที่ 4 180%

50x10 Tablets



RELIEF PAIN AND FEVER

CONTAINS PARACETAMOL 500 mg

(PARACETAMOL TABLETS 500 MG)

PARACAP



เอกสารกำกับยา
พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
- 1. โรคตับหรือโรคไตเรื้อรังก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องเลือดขาว (G6PD)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

เอกสารกำกับยา
พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

พาราแคพ

(ยาม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.)

คำเตือน

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับ หรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ตื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวาย และเสียชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีอีซีพีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับ หรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้อยกว่า 34	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาดูติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาภายใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาออกจากแสง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา : เม็ดรูปยาวนูน ปลายมนทั้งสองด้าน สีขาว มีอักษร PARACAP ทั้งสองด้าน

ตัวยาลักษณะ : พาราเซตามอล

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพด, แป้งมันสำปะหลัง, โพวิโดน, โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์, เมทิลพาราเบน, โซเดียม สตาบิลิซอร์ โกลโคเลท, แมกนีเซียม สเตียเรท และน้ำ

ผลิตโดย : บริษัท ฟอนด์ เคมีคอล จำกัด

เลขที่ 1/18 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท มาซาลาบ จำกัด

เลขที่ 52 ซอยท่าข้าม 14 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย โทร. 0-2971-6299 แฟกซ์ 0-2971-6696

อีเมล : info@masalab.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2568

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเว็บไซต์ของ อย.

<https://druglink.fda.moph.go.th/>

U1DR1A1022671509611C พรี



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 50 แผง

ส่วนขยายที่ 5 180%



ฉลากพื้น : สีเขียว เหลือง

ตัวอักษร : สีขาว ดำ เขียว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความ “ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม” อยู่ใต้ชื่อการค้าให้เห็นชัด โดยมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของข้อความที่มีขนาดตัวอักษรใหญ่ที่สุดในฉลากและสีอักษรติดกับสีพื้น

ขอรับรองว่าฉลากและเอกสารกำกับยาอยู่บนแผ่นเดียวกันและพื้นที่ของเอกสารกำกับยาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ฉลาก หรือหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด

ขอรับรองว่าขนาดตัวอักษรของผู้ผลิตเป็น 2 เท่าของผู้แทนจำหน่าย

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

อภาพ
นายอภาพ เทพสุธรรม

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 100 แผง
ส่วนขยายที่ 1 150%

พาราเซท[®]

(ยานีตบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.)

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol 500 mg

สรรพคุณ : ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้ :

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักน้อยกว่า 34	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
น้ำหนักตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

Reg. No. 1A 15096/67

Lot & Control No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสิ้นอายุ)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 100 แผง
ส่วนขยายที่ 2 180%

พาราแคพ®

(ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.)

ยานี้มีพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม

ลดไข้ บรรเทาปวด



100 X 10 Tablets

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 100 แผง
ส่วนขยายที่ 3 150%

PARACAP[®]
(PARACETAMOL TABLETS 500 MG)
CONTAINS PARACETAMOL 500 mg
RELIEF PAIN AND FEVER

คำเตือน

1. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำ
ในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้
เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกัน
เกิน 5 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพารา-
เซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้
ได้รับยาเกินขนาด
3. ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่ม
สุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า
เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง
ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบ
ปรึกษาแพทย์ทันที

สภาวะการเก็บรักษา :
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า
30 องศาเซลเซียส

ยาสามัญประจำบ้าน

Manufactured by :-
POND CHEMICAL CO., LTD.
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka,
Pathumthani 12150, Thailand



Distributed by :-
MASALAB CO., LTD.
52 Soi Thakham 14, Samaedam,
Bangkhunthian, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 0-2971-6299 Fax 0-2971-6696
E-mail address : info@masalab.com

241 mm.

20 mm.

<Description of Labelling>

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 100 แผง
ส่วนขยายที่ 4 180%

100 X 10 Tablets



RELIEF PAIN AND FEVER

CONTAINS PARACETAMOL 500 mg

(PARACETAMOL TABLETS 500 MG)

PARACAP[®]

เอกสารกำกับยา

พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

พาราแคป[®]

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปริกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาให้หากมีภาวะพ่วงซิกซ์พีที (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดหรือฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้ง่ายขึ้น
- ปริกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาให้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น
- บวมที่ใบหน้า ปวดท้อง ริมฝีปาก ลมพิษ
 - ท้องเสีย เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ผื่นพอง ผิวหนังหลุดลอก
 - มีไข้ตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย
- ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

เอกสารกำกับยา

พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

พาราแคพ[®]

(ยาม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.)

คำเตือน

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยา ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวาย และเสียชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ยา ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องกลีเซอิกซีดีที (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดหรือฟาร์ริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้ง่ายขึ้น
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้อยกว่า 34	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันทั่วถึงจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาดูติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์ เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม หน้ามึนงง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจุดตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา : เม็ดรูปยาวนูน ป้ายมโนทั้งสองด้าน สีขาว มีอักษร PARACAP ทั้งสองด้าน

ด้วยสำคัญ : พาราเซตามอล

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพด, แป้งมันสำปะหลัง, โพวีโดน , โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์, เมทิลพาราเบน, โซเดียม สตาโรล โกลโคเลท, แมกนีเซียม สเตียเรต และน้ำ

ผลิตโดย :- บริษัท ฟอนด์ เคมีคอล จำกัด

เลขที่ 1/18 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

จัดจำหน่ายโดย :- บริษัท มาซาแลบ จำกัด

เลขที่ 52 ซอยท่าข้าม 14 แขวงสามวา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

10150 ประเทศไทย โทร. 0-2971-6299 แฟกซ์ 0-2971-6696

อีเมล : info@masalab.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ :- 17 มีนาคม 2568

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อช.
<https://dlink.fda.moph.go.th/IDR1A-1022671509611C.html>



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาด 100 แผง

ส่วนขยายที่ 5 180%