

ฉลากหลอดบรรจุยาทุกขนาดบรรจุ



ขนาดจริง 100%



ขนาดจริง 200%

ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า ขาว

ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
ขอรับรองว่าพื้นที่ฉลากหลอดบรรจุยาน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

หมายเหตุ เนื่องจาก Lot & Control No. และ Exp. ทางบริษัทได้ทำการสลักบนเนื้อพลาสติกโดยตรง เพื่อให้ยากต่อการหลุดลอก
และลบเลือนออกไป จึงไม่ให้เห็นงไว้ในฉลาก



นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 1, 2, 5 หลอด



ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว
 ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

(Handwritten signature)

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา

ขนาด 1, 2, 5 หลอด

ส่วนขยายที่ 1

ฟาร์มา อินโนวา

ลูบริคแตนท์ อายส์ดรอปส์

ใน 1 มล. ประกอบด้วย

Dextran	1.00 mg (0.1%w/v)
Hypromellose	3.00 mg (0.3%w/v)

ข้อบ่งใช้:

บรรเทาอาการแสบตาและระคายเคืองตาที่เกิดขึ้นชั่วคราว เนื่องจากตาแห้ง น้ำตาหรือสารหล่อลื่นในตาหลังน้อย ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองตาที่ไปรุนแรง จากการถูกลมหรือแสงแดด

วิธีการใช้ยา:

- ล้างมือให้สะอาด
- ดึงหลอดยาออกจากแพง และเปิดหลอดยาโดยการบิดฝาหลอดออก
- ถือหลอดยาให้อยู่ในลักษณะคว่ำและเงยหน้าขึ้น
- ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาส่างลงมาให้เป็นกระจับและเหลือตาขึ้นด้านบน
- หยอดยา 1-2 หยดลงในกระจับของเปลือกตาส่าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสตา ขนตา เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
- ปล่อยมือจากเปลือกตาส่าง และอย่ากระพริบตาสักครู่
- หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น และทิ้งหลอดหยดไป หลังจากใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้ใช้ซ้ำอีก

ขนาดยาที่แนะนำ:

หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด เมื่อมีอาการ

คำเตือนและข้อควรระวัง:

ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการปวดศีรษะ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ระคายเคืองตา ตาแดงนานติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน

ห้ามใช้หากน้ำยามีลักษณะผิดปกติ เช่น เปลี่ยนสี ขุ่น หรือมีตะกอน ห้ามใช้หากภาชนะบรรจุ หรือบรรจุภัณฑ์ภายนอกไม่ปิดผนึก หรือชำรุด ไม่สัมผัสปลายหลอดที่แตกแล้ว และไม่ใช้ปลายหลอดสัมผัสลูกบิดตา หรือพื้นผิวรอบดวงตา

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้

ข้อห้ามใช้:

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ เดกซ์แทรน หรือไฮโพรเมลโลส หรือส่วนประกอบอื่นๆ

สภาวะการเก็บรักษา:

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

โปรดทิ้งไปภายใน 12 ชั่วโมง หลังเปิดหลอดแล้ว



Lubricant
Eyes drops

PHARMA INNOVA



ขนาดขยาย 160%

PHARMA INNOVA

Lubricant Eyes drops



ฟาร์มา อินโนวา



ลูบริคแตนท์ อายส์ดรอปส์



น้ำตาเทียม
ปราศจากสารกันเสีย

ผลิตกันที่ปราศจากเชื้อ

Reclosable
..... containers (0.8 mL)

บรรเทาอาการ

- 💧 แสบตา
- 💧 ระคายเคืองตา
- 💧 อาการตาแห้ง
- 💧 ไม่สบายตา

Reg. No. XX XX/XX
 Lot. No.
 Mfg. Date
 Exp. Date
 (ยาสิ้นอายุ)

Barcode

ยาใช้เฉพาะที่ ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา

ขนาด 1, 2, 5 หลอด

ส่วนขยายที่ 1

ฟาร์มา อินโนวา

ลูบริคแตนท์ อายส์ดรอปส์

Manufactured by
PHARMA INNOVA CO., LTD.
 1/38 Moo 4, Liebklong 7 Road, Buengkamproi,
 Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
 Tel. (66) 2971-5335 Fax (66) 2971-5470
 Email: mkt@pharmainnova.co.th

ขนาดขยาย 160%

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 10, 15, 20 หลอด

ส่วนที่ 2

ฟาร์มา อินโนวา
ลูบริคแอนท์
อายส์ดรอปส์

ใน 1 มล. ประกอบด้วย
Dextran 1.00 mg (0.1%w/v)
Hypromellose 3.00 mg (0.3%w/v)

ข้อบ่งใช้:
บรรเทาอาการระคายเคืองตาที่เกิดในสิ่วจระว เนื่องจากสาเหตุ น้ำตาหรือสารหล่อลื่นในตาแห้งน้อย ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองตาที่รุนแรง จากการใช้ยาหรือเลนส์สัมผัส

วิธีใช้:
1. ล้างมือให้สะอาด
2. ดึงหลอดยาออกจากซอง และปิดหลอดยาโดยการบิดฝาหลอดยาออก
3. ก้มหลอดยาให้อยู่ในลักษณะหัวขึ้นและเขย่งหน้าขึ้น
4. ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาข้างบนไว้ที่โคนจมูกและเหลือช่องตาขึ้นด้านบน
5. หลอดยา 1-2 หลอดลงในร่องช่องของเปลือกตาด้านล่าง รวบรวมยาไว้ปลายหลอดสัมผัสตา วนตา เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
6. บ่อยครั้งอาจเปลือกตาข้างล่าง และอาจระคายเคืองตาได้
7. หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ก็ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น และทิ้งหลอดยาไป หลอดยาใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้ใช้ซ้ำ

ขนาดยาที่ใช้:
หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด เมื่อมีอาการ

คำเตือนและข้อควรระวัง:
ควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการแพ้ยา: แผลตา การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ระคายเคืองตา ตามเขย่งเขย่งตาเกินกว่า 3 วัน ห้ามใช้หากมีอาการแพ้ยาชนิดใดก็ได้ เช่น แอลเลอร์จี หรือมีคอนแทกเลนส์ใส่ในตาขณะใช้ยา หรือระคายเคืองตาขณะใช้ยาชนิดอื่น หรือใส่คอนแทกเลนส์ใส่ในตาขณะใช้ยา และไม่มีในสายหลอดยามีสัญลักษณ์ หรือขึ้นฉัตรรอบดวงตา ห้ามใช้กับตาของเด็ก
อย่าใส่เลนส์สัมผัสทันที

ข้อห้ามใช้:
ห้ามใช้ในผู้ป่วยเด็ก เด็กทารก หรือสตรีมีครรภ์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ

การเก็บรักษา:
เก็บที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียส

โปรดทิ้งไปภายใน 12 ชั่วโมง หลังเปิดหลอดแล้ว

Manufactured by
PHARMA INNOVA CO., LTD.
1/38 Moo 4, Liebkhlong 7 Road, Buengkamproi, Lam Luk Ka,
Pathumthani 12150, Thailand
Tel: (662) 971-5335 Fax (662) 971-5470
e-mail: mkt@pharmainnova.co.th

ส่วนที่ 1

PHARMA INNOVA

Lubricant
Eyes
drops

PHARMA INNOVA

Lubricant
Eyes
drops



RELIEF OF
Burning
Irritation
Eye Dryness
Discomfort

Lubricant
Eye Drops
PRESERVATIVE FREE
Sterile Solution
..... Reclosable containers (0.8 mL)

Reg. No. xx xx/xx

Lot. No.

Mfg. Date

Exp. Date (ถ้ามี)

Barcode

ยาใช้เฉพาะที่ ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

ขนาด 100%

ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว
ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ
<Description of Labelling>

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและที่บ่อกฎต้องตรงตาม
มาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

ส่วนขยายที่ 2

พาร์นา อินโนวา ลูบริดแดนท์ อายส์ดรอปล์

ใน 1 เบล. ประกอบด้วย

Dextran 1.00 mg (0.1%w/v)
Hypromellose 3.00 mg (0.3%w/v)

ข้อบ่งใช้:

บรรเทาอาการแสบตาและระคายเคืองตาที่เกิดขึ้นชั่วคราว เนื่องจากตาแห้ง น้ำตาหรือสารหล่อลื่นในตาแห้งน้อย ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองตาที่ไม่รุนแรง จากการถูกลมหรือแสงแดด

วิธีการใช้ยา:

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ดึงหลอดยาออกจากแพง และเปิดหลอดยาโดยการบิดฝาหลอดออก
3. ถึงหลอดยาให้อยู่ในลักษณะคว่ำและเขยหน้าขึ้น
4. ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาส่างลงมาให้เป็นกระพุ้งและหลอมตาขึ้นด้านบน
5. หลอดยา 1-2 หยดลงในกระพุ้งของเปลือกตาส่าง ระงับอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสเมสตา ขนตา เปลือกตา ฝอ และสิ่งอื่นใด
6. ปิดฝอหลอดยาหลังจากหยดแล้ว และอย่ากระแทกหรือเสียดสีกลัศรู
7. หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น และถึงหลอดหยดไป หลังจากใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้ใช้ซ้ำอีก

ขนาดยาที่ใช้:

หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด เมื่อมีอาการ

คำเตือนและข้อควรระวัง:

ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการปวดศีรษะ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ระคายเคืองตา ตามแดงนานติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน ห้ามใช้หากนัยานลักษณะผิดปกติ เช่น เปลี่ยนสี ขุ่น หรือมีตะกอน ห้ามใช้หากกาบขมบวมหรือระงับที่ตาภายนอกไปปิดผนึก หรือชำรุด ไม่สัมผัสปลายหลอดกับตาดแล้ว และไม่สัมผัสหลอดสัมผัสลูกนัยตา หรือมีเมือระอบดวงตา เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

ปิดฝาให้สนิทหลังการเปิดใช้

ข้อห้ามใช้:

ห้ามใช้ในผู้แพ้ เดกซ์แทรน หรือไฮโปเมลโลส หรือส่วนประกอบอื่นๆ

ลักษณะการเก็บรักษา:

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

โปรดทิ้งไปภายใน 12 ชั่วโมง หลังเปิดหลอดแล้ว

Manufactured by
PHARMA INNOVA CO., LTD.
 1/38 Moo 4, Liebklong 7 Road, Buengkamproi, Lam Luk Ka,
 Pathumthani 12150, Thailand
 Tel: (662) 971-5335 Fax (662) 971-5470
 e-mail: mkt@pharmainnova.co.th

ขนาดขยาย 160%

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา
ขนาด 10, 15, 20 หลอด

ส่วนขยายที่ 1

Reg. No. XX XX/XX
Lot. No.
Mfg. Date
Exp. Date (ชาวไทย)



PHARMA INNOVA

Lubricant Eyes drops



RELIEF OF

- Burning
- Irritation
- Eye Dryness
- Discomfort

Lubricant
Eye Drops

PRESERVATIVE FREE

Sterile Solution

..... Reclosable containers (0.8 mL)

Barcode

ยาใช้เฉพาะที่ ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

PHARMA INNOVA

Lubricant Eyes drops



ขนาดขยาย 160%

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 30, 32 หลอด

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2



ขนาด 80%

ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว
ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรฐาน 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะมาศ ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา
ขนาด 30, 32 หลอด

ส่วนขยายที่ 1

Lubricant
Eyes drops

PHARMA INNOVA

PHARMA INNOVA

Lubricant
Eyes drops



RELIEF OF

- Burning
- Irritation
- Eye Dryness
- Discomfort

Lubricant Eye Drops
PRESERVATIVE FREE
Sterile Solution

..... Reclosable
containers (0.8 mL)



พาร์น่า อินโนวา

ลูบริคแตนท์
อายส์ดรอปส์

ข้อบ่งใช้:

บรรเทาอาการแสบตาและระคายเคืองตาที่เกิดขึ้นเฉีงคร่าว เนื่องจากตาแห้ง น้ำตาหรือสารหล่อลื่น
ในตาหลังน้อย ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองตาที่ไม่รุนแรง จากการถูกลมหรือแสงแดด

วิธีการใช้ยา:

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ดึงหลอดยาออกจากแพง และเปิดหลอดยาโดยการบิดฝาหลอดออก
3. ถือหลอดยาให้อยู่ในลักษณะคว่ำและเงยหน้าขึ้น
4. ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระจ่างและเหลือบตาขึ้นด้านบน
5. หยอดยา 1-2 หยดลงในกระพุ้งของเปลือกตาด้าน ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสสัมผัสตา
บนตา เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
6. บล่อยมือจากเปลือกตาด้าน และอย่ากระพริบตาสักครู่
7. หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น และทิ้งหลอดหยดไป
หลังจากใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้ใช้ซ้ำอีก

ขนาดยาที่แนะนำ:

หยอดตารั้งละ 1-2 หยด เมื่อมีอาการ

คำเตือนและข้อควรระวัง:

ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการปวดศีรษะ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ระคายเคืองตา ตามต
นามติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน

ห้ามใช้หากน้ำยามีลักษณะผิดปกติ เช่น เปลี่ยนสี ฟุ้ง หรือมีตะกอน

ห้ามใช้หากภาชนะบรรจุ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ภายนอก ไม่ปิดผนึก หรือชำรุด

ไม่สัมผัสปลายหลอดที่ปิดแล้ว และไม่ใช้ปลายหลอดสัมผัสลูกตานั้นตา หรือสัมผัสรอบดวงตา

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

ปิดฝาให้สนิทหลังการเปิดใช้

ข้อห้ามใช้:

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ เดกซ์แทรน หรือไฮโปเมเนลโลส หรือส่วนประกอบอื่นๆ

สถานะการเก็บรักษา:

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

โปรดทิ้งไปภายใน 12 ชั่วโมง หลังเปิดหลอดแล้ว

Reg. No. xx xx/xx

Lot. No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสี้นอายุ)

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 30, 32 หลอด

ส่วนขยายที่ 2

ฟาร์มา อินโนวา

ลูบริค อายส์



บรรเทาอาการ

- ▶ แสบตา
- ▶ ระคายเคืองตา
- ▶ อาการตาแห้ง
- ▶ ไม่สบายตา

น้ำตาเทียม
ปราศจากสารกันเสีย
ผลิตกันที่ปราศจากเนื้อ

..... Reclosable
containers (0.8 mL)



PHARMA INNOVA

Lubricant Eyes drops

Dextran and Hypromellose

Each 1 mL contains:-

Dextran	1.00 mg (0.1%w/v)
Hypromellose	3.00 mg (0.3%w/v)

Lubric-eyes is a Preservative-free artificial tear which gently soothes and relieves your eyes from dryness and irritation.

Lubric-eyes can be used in sensitive dry eyes, or ones who need to apply more frequently.

Lubric-eyes can be used as often as necessary.

Indications

For the temporary relief of burning and irritation due to dryness of the eye and for use as a protectant against further irritation. For the temporary relief of discomfort due to minor irritations of the eye or to exposure to wind or sun.

Recommended Dose

Adult and children: Instill 1-2 drops into the affected eye(s).

Warnings and precautions

Headache, eye pain, vision changes, irritation of the eyes, persistent redness, or if the condition worsens or persists for more than 3 days, they are to discontinue use and consult their doctor.

Do not use if solution changes color, becomes cloudy or a precipitate is present.

Do not use if the container or carton is unsealed or damaged.

Do not touch the tip of the opened container and do not touch the surface of the eye or its surrounding area with the tip of container.

Keep this drug out of the reach of children

Replace cap tightly after using

Contraindications

Hypersensitivity to Dextran or Hypromellose or any of the excipients.

Storage condition

Store below 30 °C

DISCARD CONTAINER 12 HOURS AFTER OPENING.

ยาใช้เฉพาะที่ ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

Manufactured by

PHARMA INNOVA CO., LTD.

1/38 Moo 4, Liebklong 7 Road, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5335 Fax (66) 2971-5470 Email: mkt@pharmainnova.co.th

Barcode

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 40, 50 หลอด



ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ขนาด 80%

ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว
ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนง ชำสกุล



Lubricant Eyes drops

PHARMA INNOVA

PHARMA INNOVA

Lubricant Eyes drops



- RELIEF OF**
- Burning**
 - Irritation**
 - Eye Dryness**
 - Discomfort**

Lubricant Eye Drops
PRESERVATIVE FREE
Sterile Solution

..... **Reclosable**
containers (0.8 mL)



ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา

ขนาด 40, 50 หลอด

ส่วนขยายที่ 1

ฟาร์มา อินโนวา

ลูบริคแตนท์ อายส์ดรอปส์

ข้อบ่งชี้:

บรรเทาอาการแสบตาและระคายเคืองที่เกิดขึ้นชั่วคราว เนื่องจากตาแห้ง น้ำตาหรือสารหล่อลื่นในตาลดน้อย ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองตาที่ไม่รุนแรง จากการถูกลมหรือแสงแดด

วิธีการใช้ยา:

1. ล้างมือให้สะอาด
2. หักหลอดยาออกจากแผง และเปิดหลอดยาโดยการบิดฝาหลอดออก
3. หักหลอดยาที่อยู่ใกล้ขณะคว่ำและเงยหน้าขึ้น
4. ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาข้างบนให้เปิดกระพุ้งและเหลือบตาขึ้นด้านบน
5. หยอดยา 1-2 หยดลงในกระพุ้งของเปลือกตาข้าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสตา ขนตา เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
6. ปล่อยให้จากเปลือกตาล่าง และอย่ากระพริบตาสักครู่
7. หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น และทิ้งหลอดยาที่เหลือจากใช้แล้วไม่ควรถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำอีก

ขนาดยาที่ใช้:

หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด เมื่อมีอาการ

คำเตือนและข้อควรระวัง:

ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการปวดศีรษะ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ระคายเคืองตา ตาแดง ขนตาติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน ห้ามใช้หากมีอาการเยื่อตาอักเสบ เช่น เยื่อเยื่อ เยื่อ หรือมีตะกอน ห้ามใช้หากมีอาการแพ้ยา หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอก ไม่ปิดผนึก หรือชำรุด ไม่สัมผัสปลายหลอดกับตาแล้ว และไม่ใช้ปลายหลอดสัมผัสลูกตาด้านใน หรือสัมผัสเยื่อเมือกของตา เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้

ข้อห้ามใช้:

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ เทกซ์แทน หรือไฮโปอัลเลอร์เจนิก หรือส่วนประกอบอื่นๆ

สถานการณ์ที่ปรึกษา:

เก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส

โปรดทิ้งไปภายใน 12 ชั่วโมง หลังเปิดหลอดแล้ว

Reg. No. xx xx/xx
 Lot. No.
 Mfg. Date
 Exp. Date
 (ยาสิ้นอายุ)

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา
ขนาด 40, 50 หลอด
ส่วนขยายที่ 2

พาร์มา อินโนวา

ลูบริค
อายส์
ดรอปส์



บรรเทาอาการ

- ▶ แสบตา
- ▶ ระคายเคืองตา
- ▶ อาการตาแห้ง
- ▶ ไม่สบายตา

น้ำตาเทียม
ปราศจากสารกันเสีย
ผลิตกันที่ปราศจากเชื้อ

..... Reclosable
containers (0.8 mL)



PHARMA INNOVA
**Lubricant
Eyes drops**

Dextran and Hypromellose

Each 1 mL contains:-

Dextran	1.00 mg (0.1%w/v)
Hypromellose	3.00 mg (0.3%w/v)

Lubric-eyes is a Preservative-free artificial tear which gently soothes and relieves your eyes from dryness and irritation. Lubric-eyes can be used in sensitive dry eyes, or ones who need to apply more frequently. Lubric-eyes can be used as often as necessary.

Indications

For the temporary relief of burning and irritation due to dryness of the eye and for use as a protectant against further irritation. For the temporary relief of discomfort due to minor irritations of the eye or to exposure to wind or sun.

Recommended Dose

Adult and children: Instill 1-2 drops into the affected eye(s).

Warnings and precautions

Headache, eye pain, vision changes, irritation of the eyes, persistent redness, or if the condition worsens or persists for more than 3 days, they are to discontinue use and consult their doctor.

Do not use if solution changes color, becomes cloudy or a precipitate is present.

Do not use if the container or carton is unsealed or damaged.

Do not touch the tip of the opened container and do not touch the surface of the eye or its surrounding area with the tip of container.

Keep this drug out of the reach of children

Replace cap tightly after using

Contraindications

Hypersensitivity to Dextran or Hypromellose or any of the excipients.

Storage condition

Store below 30 °C

DISCARD CONTAINER 12 HOURS AFTER OPENING.

ยาใช้เฉพาะที่ ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

Manufactured by

PHARMA INNOVA CO., LTD.

1/58 Moo 4, Liebkhilong 7 Road, Buengkamprong, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5315 Fax (66) 2971-5470 Email: miki@pharmainnova.co.th

Barcode