

ฉลากขวดแก้วสีชา

คาร์โบโซล ไซรัป

ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา คาร์โบซิสเตอีน 250 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้เพื่อละลายเสมหะ มีส่วนช่วยในการรักษาโรคระบบทางเดิน
หายใจที่มีเสมหะมาก เสมหะเหนียวข้น รวมถึงโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

ขนาดยาและวิธีรับประทาน

เด็ก 2-5 ปี: รับประทานครั้งละ 1.25 – 2.5 มล. วันละ 4 ครั้ง

เด็ก 5-12 ปี: รับประทานครั้งละ 5 มล. วันละ 3 ครั้ง

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 15 มล. วันละ 3 ครั้ง
ลดขนาดยาลงเป็น 10 มล. วันละ 3 ครั้งเมื่ออาการดีขึ้น

ข้อพิจารณาทั่วไปในการใช้ยา:

ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีประวัติเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร
และลำไส้ส่วนดูโอดินัม

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ตัวยาลำคัญหรือส่วนประกอบของยานี้

การเก็บรักษา: เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันแสง

อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

Manufactured by:

SEVEN STARS PHARMCEUTICAL CO., LTD.

18/5 Moo 1, Banmai, Samphran,

Nakhonpathom 73110 THAILAND

Tel. 0-2420-3887-8 Fax. 0-2420-3202

www.sevenstars.co.th

BARCODE

60 mL

CARBOSOL SYRUP

Each 5 mL contains :
Carbocisteine 250 mg



SEVEN STARS
PHARMACEUTICAL
SINCE 2007

Each 5 mL contains : Carbocisteine 250 mg

Indication: Mucolytic agent indicated in adults and children 2 years and above for the adjunctive therapy of respiratory tract disorders characterized by excessive, viscous mucus, including chronic obstructive airways disease.

Route of administration: oral use

Dose :

Adults including the elderly:

Initially 15 mL 3 times daily, reducing to 10 mL 3 times daily, as condition Improves.

Children:

Children 2 – 5 years: The usual dose is

1.25 – 2.5 mL four times daily

Children 5 – 12 years: The usual dose is

5 mL three times daily

General consideration:

Caution is recommended in the elderly, in those with a history of gastroduodenal ulcers.

Contraindication: Hypersensitivity to the active substance or to any of excipients listed.

Storage condition: Keep in tight containers, protected from light. Store below 30°C

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date