


ฉลากขวดบรรจุยาทุกขนาดบรรจุ



สีพื้น : สีขาว
 สีตัวอักษร : สีดำ แดง

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
 ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
 ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)
 หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนาถ ขำสกุล

ฉลากขวดบรรจุยาทุกขนาดบรรจุ
ขนาดขยาย 180%

128 mm.

40 mm.

อะซิโท ทราย ไซรัป

สำหรับรับประทาน

ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

อะซิโทรมัยซิน ไดไฮเดรท เทียบเท่า อะซิโทรมัยซิน 200 มิลลิกรัม

ขนาดและวิธีใช้ : ดูในเอกสารกำกับยา

การผสมยา :

- o เคาะขวดยาเพื่อให้ผงยาในขวดไม่จับเป็นก้อน
- o ใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติเติมลงในขวดตามปริมาตรที่กำหนด (9 มล.)
- o เขย่าให้ยาละลายเข้ากัน

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาลิ้นอายุ)

15 mL

(Approx) (After reconstitution)
Oral powder

**AZITO
DRY SYRUP**

Azithromycin 200 mg / 5 mL

คำเตือน :

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้

การเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส หลังผสมยาเก็บได้ 10 วัน

ยาอันตราย



ผลิตโดย

หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์โคมิดคอล ประเทศไทย

79 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220


โทร 0-2900-5588 แฟกซ์ 0-2552-1943

ขอรับรองว่าข้อมูลบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)
หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนาท ขำสกุล



ฉลากกล่องกระดาศบรจุชวดยา



**ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี**

นางสาวปิยะนาถ ขำสกุล

สีพื้น : สีขาว
สีตัวอักษร : สีดำ แดง

ฉลากกล่องกระดาษบรรจุ 6 และ 10 ขวด



สีพื้น : สีขาว
สีตัวอักษร : สีดำ แดง

AZITO DRY SYRUP

..... mL

AZITO DRY SYRUP

Oral powder

Azithromycin 200 mg/5 mL

ฉลากกล่องกระดาษบรรจุ 6 และ 10 ขวด
ส่วนขยายที่ 1 ขนาดจริง 100%

อะซิโท ทราย ไซรัป

ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะซิโทรมัยซิน ไดไฮเดรท
เทียบเท่า อะซิโทรมัยซิน 200 มิลลิกรัม

ขนาดและวิธีใช้ : ดูในเอกสารกำกับยา

การผสมยา

- o เคาะขวดยาเพื่อให้ผงยาในขวดไม่จับเป็นก้อน
- o ใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติเติมลงในขวดตามปริมาณที่กำหนด (9 มล.)
- o เขย่าให้ยาละลายเข้ากัน

ยาอันตราย

ฉลากกล่องกระดาษบรรจุ 6 และ 10 ขวด
ส่วนขยายที่ 2 ขนาดจริง 100%

..... mL

AZITO DRY SYRUP

สำหรับรับประทาน

Azithromycin 200 mg/5 mL

Barcode

คำเตือน :

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
หลังผสมยาเก็บได้ 10 วัน



ผลิตโดย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
79 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 0-2900-5588 แฟกซ์ 0-2552-1943

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสี้นอายุ)