


ข้อความบนฉลากแผง Blister pack (Alu-Alu) บรรจุยา 10 เม็ด




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)
หรือ ๒๘(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

[Signature]

นางสาวปิยะนิต ขำสกุล



ข้อความบนฉลากแผง Blister pack (Alu-PVC) บรรจุยา 10 เม็ด




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓)
หรือ ๒๕(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

Signature

นางสาวปิยะนาถ ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 1 แผง



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของเภสัชกรถูกต้องและเชื่อถือ
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓)
หรือ ๒๖(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

Signature

นางสาวปิยะนดา จำสกล


15 mm 12

[illegible]

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 1 แผง

ส่วนขยาย 130%

12 mm 30 mm 110 mm 30 mm 12 mm



นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

LEVOZINE
 Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

Each film-coated tablet contains:
 Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

ข้อควรระวัง
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด

คำเตือน
 1. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้
 2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือแอลกอฮอล์
 3. ไม่ควรใช้ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

การเก็บรักษา
 - เก็บในที่แห้งและเย็น
 - เก็บในที่แห้งและเย็น
 - เก็บในที่แห้งและเย็น

ข้อมูลอื่น
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด

Exp. Date
 (ยาสิ้นอายุ)

Mfg. Date
 (วันที่ผลิต)

Lot No.
 (เลขประจำล็อต)

Reg. No.
 (เลขทะเบียน)

ข้อมูลอื่น : ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารอื่นใด

5x10 Tablets
For oral use

LEVOZINE

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

LEVOZINE


LEVOZINE

Manufactured by :-
UMEDA CO., LTD.
 26/18-21 Soi Yuyen, Ram-Indra Road, Moo 9,
 Taraeng, Bang Khen, Bangkok 10230, Thailand
 Tel. 0-2943-5588 Fax 0-2943-5038

Bar Code

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 5 แผง
 ส่วนขยาย 150%

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 10 แผง



LEVOZINE



10x10 Tablets
For oral use

LEVOZINE

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

คำเตือน

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

สภาวะการเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Bar Code

จำกัดใช้เฉพาะโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ร้านขายยา และคลินิกเวชกรรม

Manufactured by :-

UMEDA CO., LTD.

26/18-21 Soi Yuyen, Ram-Indra Road, Moo 9, Taraeng, Bang Khen, Bangkok 10230, Thailand Tel. 0-2943-5588 Fax 0-2943-5038

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

LEVOZINE

10x10 Tablets
For oral use



LEVOZINE เลโวซีน

Each film-coated tablet contains : Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

ข้อบ่งใช้ : ใช้อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะต่อไปนี้ เช่น

- เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (รวมถึงเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด persistent rhinitis) ได้แก่ อาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล คันตา ตาแดง น้ำตาไหล
- ผื่นลมพิษ

วิธีใช้ยา : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

ข้อห้ามใช้ :

- เคยแพ้ยานี้ หรือยาเซทิริซีน หรือยาไฮดรอกซีซีนหรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง และต้องล้างไต

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสิ้นอายุ)


ยาอันตราย

LEVOZINE

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 10 แผง

ส่วนขยาย 120%

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 25 แผง



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓)
หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนารถ ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu)
และ Blister pack (Alu-PVC) 25 แผง
ส่วนขยายที่ 1 80%

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

LEVOSINE

25x10 Tablets
For oral use



LEVOSINE เลโวซีน

Each film-coated tablet contains: Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสถานะต่อไปนี้ เช่น

- เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (รวมถึงเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด persistent rhinitis) ได้แก่ อาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล คันตา ตาแดง น้ำตาไหล
- ผื่นลมพิษ

วิธีใช้ยา : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

ข้อห้ามใช้

- เคยแพ้ยานี้ หรือยาเซทิริซีน หรือยาไฮดรอกซีซีนหรือส่วนผสมของยานี้
- มีภาวะไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง และต้องล้างไต

Bar Code



LEVOSINE

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

25x10 Tablets
For oral use

คำเตือน

1. ยานี้อาจมีต่อการพลี
 2. ไม่ควรรับ
 3. ไม่ควรใช้
- จำกัดใช้เฉพาะ
สถานการณ์

Manufactured
UMEDA C
26/18-21 So
Taraeng, Ba
Tel. 0-2943-

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu)

และ Blister pack (Alu-PVC) 25 แผง

ส่วนขยายที่ 2 80%

lets
use

คำเตือน

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
 2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 3. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีที่ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- จำกัดใช้เฉพาะโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ร้านขายยา และคลินิกเวชกรรม
สถานะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Manufactured by :-

UMEDA CO., LTD.

26/18-21 Soi Yuyen, Ram-Indra Road, Moo 9,
Taraeng, Bang Khen, Bangkok 10230, Thailand
Tel. 0-2943-5588 Fax 0-2943-5038

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date
(ยาสิ้นอายุ)


ยาอันตราย



25x10 Tablets
For oral use

LEVOZINE
Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu) และ Blister pack (Alu-PVC) 50 แผง



ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu)

และ Blister pack (Alu-PVC) 50 แผง

ส่วนขยายที่ 1 110%

คำเตือน

1. ยานี้อาจทำให้วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

จำกัดใช้เฉพาะโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ร้านขายยา และคลินิกเวชกรรม
สถานะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Manufactured by :-
UMEDA CO., LTD.

26/18-21 Soi Yuyen, Ram-Indra Road, Moo 9,
Taraeng, Bang Khen, Bangkok 10230, Thailand
Tel. 0-2943-5588 Fax 0-2943-5038

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date
(ยาสิ้นอายุ)

ยาอันตราย



50x10 Tablets
For oral use

LEVOZINE

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

Bar Code

LEV

Each fi

Levc

ข้อบ่งใช้

ใช้จาก

- เยื่อบุ

จาก

คัดจมูก

- ผื่นลม

วิธีใช้ยา

ข้อห้าม

- เคยแพ้

แพ้ส่ว

- มีภาวะ

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา Blister pack (Alu-Alu)
และ Blister pack (Alu-PVC) 50 แผง
ส่วนขยายที่ 2 110%

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg
LEVONINE

50x10 Tablets
For oral use



Tablets
For oral use

LEVONINE เลโวซีน

ยาอันตราย

Each film-coated tablet contains:

Levocetirizine dihydrochloride 5 mg

ข้อบ่งใช้

ใช้อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะต่อไปนี้ เช่น

- เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (รวมถึงเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด persistent rhinitis) ได้แก่ อาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล คันตา ตาแดง น้ำตาไหล
- ผื่นลมพิษ

วิธีใช้ยา : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

ข้อห้ามใช้

- เคยแพ้ยานี้ หรือยาเซทิริซีน หรือยาไฮดรอกซีซีนหรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง และต้องล้างไต



50x10 Tablets
For oral use

LEVONINE
Levocetirizine dihydrochloride 5 mg