

โวโนพราซาน

10, 20 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

Vocinti (โวซินตี)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าโวโนพราซาน (vonoprazan) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
- รักษาโรคหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน
- ป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการกินยาแอสไพรินหรือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ยาไอบูโพรเฟน หรือยาพริออกซิแคม
- ใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคทีเรีย (*H.pylori*)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ยานี้ ถ้าเคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา
- ห้ามใช้ยานี้ หากท่านกำลังกินยาอะทาซานาเวียร์ หรือ ยานาเฟนาเวียร์ ซึ่งเป็นยารักษาเอช ไอ วี
- ห้ามใช้ยานี้ หากท่านตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ระมัดระวังการใช้ยานี้ หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ หากท่านมีการทำงานของตับผิดปกติ หรือการทำงานของไตผิดปกติ
- หากคาดว่าจะตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยาโวโนพราซาน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำ ไม่ควรบด หรือเคี้ยวเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
- ให้รีบไปโรงพยาบาล หรือพบแพทย์ทันที หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หายใจติดขัด กลืนลำบาก หน้าซีด มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ หรือส่วนอื่นของร่างกาย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ตามแพทย์สั่ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ผิวหนัง หรือตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ปัสสาวะเป็นสีดำ และเหนียว

“ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องเสีย, ท้องผูก, คลื่นไส้อาเจียน, ท้องอืด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อนถึงเวลากินยา เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

ยาเม็ดรูบยารวี ปลายมน ฐานทั้งสองด้าน

- ขนาดยา 10 มิลลิกรัม เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “B217” อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ขนาดยา 20 มิลลิกรัม เคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “B218” อยู่คนละด้านของขีดแบ่ง

ส่วนประกอบของยานี้

ดี-แมนนิทอล โมโครคริสตอลีนเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส กรดฟูมาริก ครอสคาเมลโลส โซเดียม แมกนีเซียม สเตอเรส

ผลิตโดย Takeda Pharmaceutical Company Limited., Japan
นำเข้าโดย บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่ายโดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 9 เมษายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**