

ฉลากใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


ฉลากกล่องกระดาษ

(สำหรับทุกขนาดบรรจุ)

ส่วนขยายที่ 1

ส่วนขยายที่ 2

ส่วนขยายที่ 3



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตามมาตรฐาน ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

สีพื้นของฉลาก สีขาว, สีส้ม, สีเหลือง
ตัวอักษร สีดำ, สีขาว, สีเหลือง
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ฉลากกล่องกระดาษ

(สำหรับทุกขนาดบรรจุ)

ส่วนขยายที่ 1

.....X.....Tablets

Composition :-

Each tablet contains :-

Calcium carbonate 1000 mg
eq.to Calcium 400 mg (50% Thai RDI)

CALTAB

1000

Indications :

1. For the treatment of calcium deficiency states.
2. Calcium supplement in children, pregnant and lactating women, postmenopausal and in elderly patients.
3. Phosphate binder and maintain calcium balance in patient with chronic renal failure.
4. Antacid

Dosage and administration :

- **For the treatment of calcium deficiency :**
1 tablet 2-4 times daily after meals or as prescribed by physicians.
- **For calcium supplement :** 1 tablet 2 times daily after meals or as prescribed by physicians.
- **Phosphate binder :** 1-2 tablets 3-4 times daily with meals or as prescribed by physicians.
- **Antacid :** 1 tablet 4-6 times daily before meals or as prescribed by physicians.

Store below 30°C

Manufactured by :

MILLIMED BFS CO., LTD.
174, 179 Moo 8 Pha Ngam, Wiang Chai
Chiang Rai 57210 Thailand
Call Center +66 2945 9555

8855459009003

MI-C-06CA40-V03/07/22

ฉลากใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ฉลากกล่องกระดาษ

(สำหรับทุกขนาดบรรจุ)

ส่วนขยายที่ 2

กษฏเษมแฏฐเณบฏบฏ

0001 กษฏเษมแฏฐเณบฏ

กษฏเษมแฏฐเณบฏ



CALTAB

Calcium Carbonate 1000

รักษาการขาดธาตุแคลเซียม และสร้างเสริมธาตุแคลเซียม



แคลแทบ

แคลเซียม คาร์บอเนต 1000

ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม

ฉลากใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ฉลากกล่องกระดาษ

(สำหรับทุกขนาดบรรจุ)

ส่วนขยายที่ 3

.....X..... เม็ด

แคลเซียม

ส่วนประกอบ : โนยา 1 เม็ด ประกอบด้วย
แคลเซียม คาร์บอเนต
เทียบเท่ากับ แคลเซียม

1000 มก.

1000

400 มก. (50% Thai RDI)

สรรพคุณ :

1. ใช้รักษาภาวะการขาดแคลเซียม
2. ช่วยเสริมสร้างแร่ธาตุแคลเซียมในเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีระยะให้นมบุตร สตรีหลังหมดประจำเดือน และผู้สูงอายุ
3. เป็นตัวจับฟอสเฟต และรักษาความสมดุลของแคลเซียมในคนไข้ที่เป็นโรคไต
4. เป็นยาลดกรด

ขนาดรับประทาน :

- รักษาการขาดธาตุแคลเซียม : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-4 ครั้ง หลังอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง
- เสริมสร้างแคลเซียม : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง
- จับฟอสเฟต : รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง พร้อมอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง
- ลดกรด : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 4-6 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C

Reg. No. 1A 15192/65

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสิ้นอายุ)

ราคาแผงละ.....บาท

ฉลากใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ฉลากแผงฟอยล์ดลูมิเนียม

(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)



หมายเหตุ รอยปะบนฉลากเป็นเพียงการวางตำแหน่งเม็ดยาของทางบริษัทเท่านั้น

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

สีพื้นของฉลาก สีเหลือง, สีดำ
ตัวอักษร สีเหลือง, สีดำ
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่า หมายเลขรุ่นการผลิตและวันหมดอายุจะพิมพ์ที่ด้านใดด้านหนึ่งของแผงในขั้นตอนการผลิต

ฉลากใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ฉลากแผงฟอยล์อูมิเนียม (ขยายขนาดเพื่อดูข้อความ)

(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)

