


รูปภาพแสดง ฉลากกล่องยา Cravit® i.v. 250 mg/50 ml



รูปภาพแสดง ฉลากยาด้านใน (Inner label) Cravit® i.v. 250 mg/50 ml

BN :
MFG :
EXP :
ขาดเลข

991058335

Spot primer area 13x18 mm

Daiichi-Sankyo

250mg/50ml

Cravit® i.v.

Levofloxacin
50ml containing : 250 mg Levofloxacin
Slow intravenous infusion
Keep out of the reach of children
250mg/50ml solution for infusion (5mg/ml)


Manufactured by:
M & H Manufacturing Co., Ltd., Samutprakarn, Thailand.
Licenced by : DAIICHI SANKYO CO., LTD. Tokyo, Japan.

ยาควบคุมพิเศษ
คำเตือน
1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ
2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการ ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและไปรักษาแพทย์ทันที
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ได้

Store below 30°C
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C
Reg. No.
Under Authority of
DAIICHI SANKYO (THAILAND) LTD.

100%
(W x H = 83 x 30 mm)

รูปภาพแสดง ฉลากกล่องยา Cravit® i.v. 500 mg/100 ml



รูปภาพแสดง ฉลากยาด้านใน (Inner label) Cravit® i.v. 500 mg/100 ml

ยาสีขาว
EXP :
MFG :
BN :

991058337



500mg/100ml

Cravit® i.v.

Levofloxacin

100ml containing : 500 mg Levofloxacin
Slow intravenous infusion
Keep out of the reach of children
500mg/100ml solution for infusion (5mg/ml)

Manufactured by:
M & H Manufacturing Co., Ltd., Samutprakarn, Thailand.
Licenced by : DAIICHI SANKYO CO., LTD. Tokyo, Japan.

ยาควบคุมพิเศษ
คำเตือน

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ
- สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยา
- หากใช้ยาแล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
- ยาอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ได้


Store below 30°C
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C

Reg. No.
Under Authority of
DAIICHI SANKYO (THAILAND) LTD.

Spot primer area 15x22 mm

100%
(W x H = 133x48mm)

รูปภาพแสดง ฉลากกล่องยา Cravit® i.v. 750 mg/150 ml



รูปภาพแสดง ฉลากยาด้านใน (Inner label) Cravit® i.v. 750 mg/150 ml

128MM



BN :
 MFG :
 EXP :
 เลขใบ
 อนุญาต


750mg/150ml
Cravit® i.v.
Levofloxacin
 150ml containing : 750 mg Levofloxacin
 Slow intravenous infusion
 Keep out of the reach of children
 750mg/150ml solution for infusion (5mg/ml)

Manufactured by:
 M & H Manufacturing Co., Ltd., Samutprakarn, Thailand.
 Licenced by : DAIICHI SANKYO CO., LTD. Tokyo, Japan.

ขอสงวนลิขสิทธิ์
 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มี หรือเคยเป็นกลุ่มโรคไตในขั้นรุนแรง
 2. ควรใช้ร่วมกับยาอื่นที่จำเป็น ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดไขกระดูก
 3. ห้ามใช้ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อฟังไจ ยาต้านเชื้อปรสิต ยาต้านเชื้อไวรัส ยาต้านเชื้อเห็บและปรสิตภายนอก ยาต้านเชื้อพยาธิ
 4. ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดไขกระดูก ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดไขกระดูก ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดไขกระดูก ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดไขกระดูก

Store below 30°C
 เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C
 Reg. No.
 Under Authority of
 DAIICHI SANKYO (THAILAND) LTD.

991058339



43MM

request area for print is 15x22 mm

100%(43X128MM)