


### ฉลากกล่อง สำหรับบรรจุแผง



## ฉลากแผง



# PROTEMP OR

ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม

**ขนาดและวิธีใช้ยา:**

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

**คำเตือน:**

1. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
3. ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง คัดจมูก ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยา และรีบปรึกษาแพทย์ทันที

Reg. No.....

Lot.....

Exp.....

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ  
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากขวด

**Each capsule contains: Paracetamol 325 mg**

**Indications:**  
Protemp OR is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

**Posology**  
Adults and children aged 12 years and older:  
- Take 1 capsule every 4-6 hours.  
- If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.  
- Do not take more than 1000 mg (12 capsules) in 24 hours.  
- Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.  
Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

**Method of administration**  
Protemp OR is administered orally.

**Storage:**  
Store not exceed 30°C and protect from light.

**The Reg. No.**  
L01  
MFD  
EXP  
(in blue)

**Name and address of manufacturer :**  
Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part,  
Bangkok Thailand.



**60 Soft gelatin capsules**

**325 mg**

• Pain Reliever  
• Fever Reducer

**โปรเทมพี โออาร์**  
**ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล**

ข้อบ่งใช้: ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

ขนาดและวิธีใช้:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้หากมีอาการปวดท้องกับขนาดที่แนะนำในฉลากหรือออกสวากกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรรีใช้จนมีเลือดออกในตับ 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาลดกรดที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากสิ่งข้างต้นเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วมีอาการ เช่น นอนไม่หลับ ปวดท้อง ริมฝีปาก อัมพาบ หน้ามืด ตีบแดง คันผดผื่น มีวุ้นหรือตุ่มออก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันทีที่เห็นผล

ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงเกิน 30% และห่างจากแสง

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ  
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี



**Each capsule contains:**  
Paracetamol 325 mg

**Indications:**

Protemp OR is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

**Thai Reg. No.:**

LOT  
MFD  
EXP  
(๖ เดือน)

Manufactured by :  
Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part.  
Bangkok Thailand. Tel. 0-2331-1958

**Posology**

*Adults and children aged 12 years and older:*

- Take 1 capsule every 4-6 hours.
  - If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
  - Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
  - Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.
- Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

**Method of administration**

Protemp OR is administered orally.

**Storage:**

Store not exceed 30°C and protect from light.

**LSP**  
**PROTEMP**  
**OR** ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules



325 mg



**LSP**  
**PROTEMP**  
**OR** ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules



325 mg

**โปรเทมป์ โออาร์**  
**ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล**

ข้อพึงใช้: ใช้ข้อต่อกัน บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยเป็นกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

ขนาดและวิธีใช้:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลามีอาการเจ็บป่วย
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลามีอาการเจ็บป่วย

ห้ามดอง:

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลาก หรือเกินขนาดที่กำหนด เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยาที่ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากดื่มสุร่าเป็นประจําเป็นโรคตับหรือไต
- หากกินยาแล้วมีอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด สิ้นแรง อุณหภูมิหนึ่ง หลุดออก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

อาการการเกินรักษายา:  
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30° ซ. และพ้นจากแสง

**LSP**  
**PROTEMP**  
**OR** ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

• Pain Reliever  
• Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและพับห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ  
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากซอง  
สำหรับบรรจุแผง

Each capsule contains: Paracetamol 325 mg

**Posology**

Adults and children aged 12 years and older:

- Take 1 capsule every 4-6 hours.
  - If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
  - Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
  - Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.
- Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

**Method of administration**

Protemp OR is administered orally.

**Storage:**

Store not exceed 30°C and protect from light.

**Indications:**

Protemp OR is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

ข้อบ่งใช้: ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม สภาวะการเจ็บร้กษา: เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30° ซ และ ห่างจากแสง



**PROTEMP**<sup>LSP</sup>  
**OR** ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

10 Soft gelatin capsules



**โปรเทมพี โออาร์**  
ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

Thai Reg. No.

LOT

MFD

EXP.  
(ยาสิ้นอายุ)

Name and address of manufacturer:

**Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part.**  
Bangkok Thailand.

ขนาดและวิธีใช้ยา:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้ยาเพราะขนาดเกินขนาดซึ่งจะนำไปสู่อาการหรือการกำเริบยา ฤทธิ์จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้จนคิดลดเกินเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาลอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปริมาณยาหรือวิธีใช้ของยานี้จะแตกต่างกันไปหากมีสุขภาพเป็นประปราย เป็นโรคตับหรือไต
- หากมีอาการแพ้หรือมีอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า ผื่นคัน หายใจลำบาก ริมฝีปาก ขนลุก หนึ่งถึง หนึ่งแฉก ผู้ป่วย ควรรีบหยุดยา และรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ  
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี