

ฉลากซอง (เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)

Please read enclosed leaflet before use

DOSAGE AND ADMINISTRATION
For infants aged 1 to 2 years. Not to be used in premature infants. Infants aged 1-12 months can be used under medical supervision.
The dosage and mixing instructions depend on the weight of your child and the feeding method you use:
Infants under 4.5kg (10lb) – one sachet
Infants over 4.5kg (10lb) – two sachets
Open the sachet(s) and mix the contents immediately before use as directed below:
Bottle fed infants: • Mix each sachet into 115ml (4 fluid oz) of feed in the bottle • Shake well • Feed as normal
Breast fed infants and other infants up to 2 years • Mix each sachet with 5ml (1 teaspoon) of cooled, boiled water until a smooth paste is formed • Add another 10ml (2 teaspoons) of cooled, boiled water and mix • For breast fed infants give Gaviscon Infant part way through each feed or meal using a spoon or feeding bottle • For all other infants give Gaviscon Infant at the end of each meal using a spoon or from feeding bottle
KEEP OUT OF REACH AND SIGHT OF CHILDREN
Each sachet is security sealed.
Do not use if damaged.
Do not store above 30°C.

Imported by: Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd., Bangkok
Manufactured by: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Hull, UK
Thai Reg No. 2C XXXXXX 0000000

GAVISCON
Infant
Sodium alginate
Magnesium alginate
Powder for oral suspension
Regurgitation and gastric reflux
ONE SACHET (0.65g)
contains 225mg sodium alginate and 87.5mg magnesium alginate.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.

LOT:

MFG-EXP:
(วันผลิต - ยาสิ้นอายุ)

CUT HERE

ชื่อของฉลาก พื้น: เขียวอมฟ้า ขาว แดง

อักษร : ขาว น้ำเงิน แดง ดำ ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบ
ห่อถูกต้องตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ 27(3) แล้วแต่กรณี