


ฉลากหลอดบรรจุยา 10 ml

ด้านหน้า:



ด้านหลัง:




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและที่บ่ห่อ ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕
(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าฉลากมีพื้นที่
ตั่กกว่า 3 ตารางนิ้ว

๗๖๑.

ฉลากขวดบรรจุยา 20 ml

ด้านหน้า:



ด้านหลัง:



ขอรับรองว่าข้อมูลบนฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและที่บ่อกู้ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าฉลากมีพื้นที่
ต่ำกว่า 3 ตารางนิ้ว

๑๖๑.

ฉลากขวดบรรจุยาทุกขนาดบรรจุ

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml solution for injection/
infusion
ropivacaine hydrochloride

ROPIvacain
200 mg / 100 ml

ยาอันตราย

1 ml contains 2 mg ropivacaine hydrochloride (as ropivacaine hydrochloride monohydrate)

One bottle of 100 ml contains 200 mg ropivacaine hydrochloride

Sodium chloride, sodium hydroxide 0.4 %, hydrochloric acid 0.36 %, water for injections

Solution for injection/infusion. Perineural and epidural use. For single use only. Read the package leaflet before use. Keep out of the sight and reach of children. Use only if solution is clear and colourless and the container and its closure are undamaged. Do not freeze. Do not store above 30 °C.

Marketing Authorisation Holder:

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

Manufactured by: B. Braun Medical S.A.,
Rubi (Barcelona), Spain



มอก. 531-2558

Reg. no.: XXXXXXXX

B | BRAUN

Imported by:
B. Braun (Thailand) Ltd.,
Bangkok, Thailand



Mfg.
date:

810/12628507/1020

Batch:
EXP:
(มาศถูก)

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภายนะบรรจุ
ทุกชนิดและที่บ่ห่อ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕
(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าฉลากมีพื้นที่
ต่ำกว่า 3 ตารางนิ้ว

๒๖๑.