


ฉลากแผง



PROTEMP

ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม

ขนาดและวิธีใช้ยา:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

1. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
3. ปฏิบัติตามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยา และรีบปรึกษาแพทย์ทันที

Reg. No.....

Lot.....

Exp.....

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากของ
สำหรับบรรจุแผง

Each capsule contains: Paracetamol 325 mg

Posology

Adults and children aged 12 years and older:

- Take 1 capsule every 4-6 hours.
 - If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
 - Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
 - Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.
- Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

Method of administration

Prot Kemp is administered orally.

Storage:

Store not exceed 30°C and protect from light.

Indications:

Prot Kemp is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

ข้อบ่งใช้: ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม
สภาวะการเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 ° C และพ้นจากแสง



PROTEMP ^{LSP}

ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

10 Soft gelatin capsules



325 mg

โปรเทมปี

ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

Thai Reg. No.

LOT

MFD

EXP.

(ยาสิ้นอายุ)

Name and address of manufacturer :
Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part.
Bangkok Thailand.

ขนาดและวิธีใช้ยา:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล สัปดาห์ละครั้งหรือบ่อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล สัปดาห์ละครั้งหรือบ่อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 3 วัน
- หลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากมีสุขภาพเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ไข้ไม่ลด ริมฝีปาก สบคัน หนักขึ้น มีเลือดจืดหรือมีจุดแดง ผิวหนังลอกออก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๔(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่อง
สำหรับบรรจุแผง

<Protemp>



ฉลากขวด

Each capsule contains: Paracetamol 325 mg

Indications:
Protemp is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

Posology
Adults and children aged 12 years and older:
- Take 1 capsule every 4-6 hours.
- If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
- Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
- Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.
Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

Method of administration
Protemp is administered orally.

Storage
Store not exceed 30°C and protect from light.

Thai Reg. No.
LOT
MFD
EXP
(or other info)

Name and address of manufacturer:
Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part.
Bangkok Thailand.



ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules 325 mg

โปรเทมปี
ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

ข้อบ่งใช้: ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้ออักเสบ

ขนาดและวิธีใช้:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยาชนิดนี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากมีไข้แล้วเกิดอาการ เช่น นวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง สุนัขเหอ ควรงดใช้ยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30° C และพ้นจากแสง

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี



PROTEMP

ยาที่มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

Each capsule contains:
Paracetamol 325 mg

Indications:

Protemp is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

Thai Reg. No.

LOT
MFD
EXP.
(ถ้ามี)

Manufactured by :
Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part.
Bangkok Thailand. Tel. 0-2-331-1958

Posology

Adults and children aged 12 years and older.

- Take 1 capsule every 4-6 hours.
 - If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
 - Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
 - Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.
- Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

Method of administration

Protemp is administered orally.

Storage:

Store not exceed 30°C and protect from light.



PROTEMP

ยาที่มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules



325 mg




PROTEMP

ยาที่มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

โปรดทราบ

ยาที่มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

ข้อพึงใช้: ใช้ข้อควรระวังที่แสดงอยู่บนกล่อง เช่น โปรดระวังโปรดเมื่อใช้ตัวโปรดที่โปรดระวังเตือนโปรดตามเนื้อโปรดหลังโปรดจากข้อเตือน

ขนาดและวิธีใช้:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาด
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

ห้ามดอง:

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในกล่อง หรือเกินที่กำหนด เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้เกินที่ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่รวมกันยาอื่นที่มีพาราเซตามอล เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากมีไข้สูงเป็นประจําเป็นโรคตับหรือไต
- หากกินยาแล้วมีอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หนัก น้หนัก สิวแดง ไข้สูง ผื่นผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

อาการการแพ้รักษา:

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30° ซ และพ้นจากแสง



PROTEMP

ยาที่มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules



325 mg



PROTEMP

ยาที่มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules



325 mg

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาษาขณะบรรจุขวดและที่บ่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๔(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี