

ฉลากขวดทุกขนาดบรรจุ



ขนาดขยาย 200%



ขนาดจริง 100%

ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว

ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าฉลากบรรจุยา มีขนาดน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้อง
ตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุขวด ขนาด 1 ขวด



ขนาด 100%

ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว

ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

Jomr

นางสาวปิยะนดา ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุขวด ขนาด 1 ขวด



ขนาดขยาย 150%

ฉลากกล่องบรรจุขวดขนาด 10 ขวด



ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว
ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี


 นางสาวปิยะนารถ ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุขวด

ขนาด 10 ขวด

ส่วนขยายที่ 1



ฉลากกล่องบรรจุขวด

ขนาด 10 ขวด

ส่วนขยายที่ 2



ขนาด 100%

ฉลากกล่องบรรจุขวดขนาด 20, 50 และ 100 ขวด



ฉลากพื้น : สีเขียวอมฟ้า น้ำเงิน ขาว
ตัวอักษร : สีเขียวอมฟ้า ขาว แดง ดำ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะมาต ขำสกุล

bottle

Bima-opt
eye drops, solution



Bima-opt

eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
Bimatoprost 0.1 mg

..... mL

ขนาด 100%

ฉลากกล่องบรรจุขวด

ขนาด 20, 50 และ 100 ขวด

ส่วนขยายที่ 1

Bima-opt
eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
Bimatoprost 0.1 mg

Indications :

Reduction of elevated intraocular pressure in chronic open-angle glaucoma and ocular hypertension in adults as monotherapy or as adjunctive therapy to beta-blockers

Dosage & Administrator :

See enclosed leaflet

Storage condition :

Store below 30°C

ยาใช้เฉพาะที่ ยาอันตราย

Reg. No. XX XX/XX

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date
(ยาเสื่อมอายุ)

ฉลากกล่องบรรจุขวด
ขนาด 20, 50 และ 100 ขวด

ส่วนขยายที่ 2



ไบมา-ออกท์
ยาหยอดตา

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
ไบมาโทพรอสต์ 0.1 มิลลิกรัม

..... mL



ไบมา-ออกท์

ยาหยอดตา

ข้อบ่งใช้ : ลดความดันในลูกตา และรักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิด

วิธีการใช้ยา : ดูเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในคนที่เคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้หรือเคยหยุดใช้ยาหยอดตาเนื่องจากเกิดผลข้างเคียง จากสารกันเสียเบนซาอิลโคเนียมคลอไรด์

ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา :

- ถอดคอนแทกเลนส์ก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้ง และสามารถสวมใส่คอนแทกเลนส์ได้หลังจากหยอดตาไปแล้วอย่างน้อย 15 นาที

- งดการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา ไม่ควรขับรถ หรือทำงานโดยใช้เครื่องมือจักรกลกว่าสายตางกลับมามองเห็นได้ตามปกติ เพราะยานี้อาจจะทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว

- หากใช้ยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

สภาวะการเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Manufactured by
Pharma Innova Co., Ltd.
1/38 Moo 4, Liebklong 7 Road, Buengkamproi,
Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5335 Fax. (66) 2971-5470
E-mail : mkt@pharmainnova.co.th

Barcode

ขนาด 100%