

ฉลากขวด

ชื่อของฉลากพื้นสี ขาว เทา เหลืองอมเขียว
ตัวอักษรสี ดำ น้ำเงิน แดง
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน



13 เม.ย. 2563

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี



13 เม.ย. 2563

Xofluza®
Granules for oral
suspension
baloxavir marboxil

2 mg/mL

For oral administration after
constitution



Granules: Do not store above 30°C, keep the bottle tightly closed in order to protect from moisture
Constituted oral suspension: Use immediately after constitution with drinking water. If immediate use is not possible, the constituted suspension may be stored up to 2 hours at 30°C (do not store above 30°C)

10023908 PF-REG



EXP
MFD

ฉลากกล่อง

ชื่อของฉลากพื้นสี ขาว เทา เหลืองอมเขียว
ตัวอักษรสี ดำ น้ำเงิน แดง
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

15 เม.ย. 2563

15 เม.ย. 2563

Xofluza®
Granules for oral suspension
baloxavir marboxil

2 mg/mL

For oral administration after constitution

1 bottle



Xofluza®
Granules for oral suspension
baloxavir marboxil


2 mg/mL

For oral administration after constitution

1 bottle



Also contains 1 press-in bottle adapter, 1 plastic 3 mL oral syringe, 1 plastic 10 mL oral syringe and 1 measuring cup of 20 mL. Take as a single one-time dose as prescribed. Discard unused portion. Use the appropriate oral syringe for your total prescribed dose.
For oral administration after constitution
Medicine: keep out of reach of children
Dosage and administration: see package insert
Granules: Do not store above 30°C, keep the bottle tightly closed in order to protect from moisture
Constituted oral suspension: Use immediately after constitution with drinking water. If immediate use is not possible, the constituted suspension may be stored up to 2 hours at 30°C (do not store above 30°C)


ยาควบคุมพิเศษ
ใช้เฉพาะโรงพยาบาล และสถานพยาบาลของรัฐ
Reg. No. 
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารกำกับยา
นำเข้าโดย บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ



Made for F. Hoffmann-La Roche Ltd Basel, Switzerland
by Shionogi Pharma Co., Ltd., Osaka, Japan

ยาสิ้นอายุ
EXP
MFD

1 bottle with 2 g granules for oral suspension contains 40 mg of baloxavir marboxil. When constituted with 20 mL of drinking water, results in a concentration of 2 mg/mL of baloxavir marboxil.
Also contains mannitol, maltitol, sodium chloride, hypromellose, povidone, colloidal silicon dioxide, sucralose, talc, strawberry flavor, purified water. No preservative.



0 000000 000000

10223891

10223891
FE-REG
62

