

ไอ-บ魯-ทิ-นิบ

140 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูลแข็ง

140 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Imbruvica® (อิม-บ魯-วิ-ก้า)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า “ไอ-บ魯-ทิ-นิบ” (INN: Ibrutinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ยา.rักษามะเร็งชนิดอื่นควบคู่ด้วยชีวอยุ่กับการตัดสินใจของแพทย์ผู้ทำการรักษา
- รักษาภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ด้านร่างกายผู้ป่วย เรื้อรัง
- รักษาโรคอลเดนสตรอมแม่โคโรโนบูลนิเมีย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เดยแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยา
- กำลังใช้สมุนไพรชื้อ เช่นตัวหันเวรต รักษาโรคซึมเศร้า

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- เพื่อความปลอดภัยให้นักแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
- มีเลือดออกผิดปกติ หรือมีประวัติเลือดออกผิดปกติ
- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” ตัวอื่นอยู่
- เป็นโรคหัวใจวาย หรือมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- กำลังจะรักษาโดยการผ่าตัด หรือเคยผ่าตัดมาก่อน
- เป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือเคยเป็น
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

- มีภาวะทางการแพทย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง คอเลสเตรอลสูง หรือโรคเบาหวาน
- มีการติดเชื้อ

“**สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่**”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยาวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาเดิมของทุกวัน
- กินยาทั้งแคปซูล ห้ามเคี้ยวหรือทำให้แคปซูลแตก ก่อนกิน
- กินยาทั้งเม็ด ห้ามตัด บด หรือเคี้ยว

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา แต่ยังอยู่ภายในการในวันที่ต้องกินยานั้น ให้กินยาทันทีที่ทันได้
- หากลืมกินยาและนึกได้มีอีกหนึ่งวันไปแล้ว ไม่ต้องกินยาชดเชยได้ ฯ เพียงยาอาจเกินขนาด แต่กรุณากินยาให้ตรงเวลาปกติต่อไป

3.3 ถ้ากินยาแล้วเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลทันทีหากมีอาการผิดปกติ (ดูเพิ่มเติมข้อ 5.1)

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามน้ำยาที่ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรค เช่นเดียวกับท่าน
- ห้ามหยดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยาที่อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลกระทบจากการใช้ยา
- คงกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้ยา นี้ และ 1 เดือนหลังกินยาครั้งสุดท้าย เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารกหากตั้งครรภ์
- ห้ามให้นมบุตรระหว่างการรักษาและช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย
- การขับรถ หรือ ทำงานกับเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ท่านควรระวัง เพราะยาอาจทำให้ง่วงหรือรู้สึกเพลียได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้อง**หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก
- ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเนื้อตัว ซึ่งเป็นอาการของติดเชื้อในร่างกาย
- เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ อุจจาระมีเลือดปนหรือสีดำ ปัสสาวะเป็นสีสนิมหรือสีเข้มพู มีจุดชา้ำจ้าเลือดที่ผิวนัง เลือดไหล่ไม่หยุด เป็นต้น
- หัวใจเต้นเร็วและผิดปกติ
- บวมที่เท้า ข้อเท้า หรือขา
- เวียนศีรษะ อ่อนแรง สับสน การพูดมีการเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะเป็นระยะเวลานานหรือปวดศีรษะรุนแรง
- อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ผิดจังหวะ
- อาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อีดอัดแน่น ห้องมาก

5.2 อาการที่**ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ครั้นเนือครั้นตัว รูสีกไม่似ายตัว ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก
- ง่วงชึม มีนัง รูสีกเพลีย เหนื่อย
- คลื่นไส อาเจียน
- มีจุดจ้ำเลือดขนาดเล็ก ฟกช้ำ ผิวหนังแดงกว่าปกติ ผื่นผิวหนัง
- ห้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ

6. เก็บยาที่อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา (ชนิดแคปซูล)

แคปซูลเจลatin แข็ง สีขาว ทึบแสง พิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ “ibr 140mg” ภายในบรรจุผงยาสีน้ำเงินสีขาว

ลักษณะยา (ชนิดเม็ด)

140 มิลลิกรัม: เม็ดยากลม สีเขียวออกเหลืองถึงสีเขียว ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวอักษร “ibr” และอีกด้านหนึ่งมีตัวเลข “140”

ตัวยาสำคัญ: ไอบรูทินิบ

ส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช้ตัวยาสำคัญ:

แคปซูลอิมบอร์วิก้า: croscarmellose sodium(ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม) magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต) microcrystalline cellulose (“ในโคโรคริสตัลลีนเชลลูโลส”) และ sodium lauryl sulfate (โซเดียมลอริลชัลเฟต) เปลือกแคปซูล 140 มิลลิกรัม ประกอบด้วย gelatin (เจลอะติน) titanium dioxide (“ในเทเนียมไดออกไซด์”) และ black ink (แบล็คอิงค์)

ยาเม็ดอิมบอร์วิก้า: colloidal silicon dioxide (คอลโลยดัลซิลิโคนไดออกไซด์) croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม) lactose monohydrate (แลกโทสโนโนไซเดรต) magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต) microcrystalline cellulose (“ในโคโรคริสตัลลีน เชลลูโลส”) povidone (โพวิdone) และ sodium lauryl sulfate (โซเดียมลอริลชัลเฟต) สารเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย ferrosoferric oxide (เฟอร์โรโซเฟอร์ริกออกไซด์) polyvinyl alcohol (โพลีไวนิลแอลกอฮอล์) polyethylene glycol (โพลีเอทิลีนไอกอคอล) talc (ทัลก์) titanium dioxide (“ในเทเนียมไดออกไซด์”) และ yellow iron oxide (เยลโล่ไอร์โอนออกไซด์)

ผู้ผลิต

ชนิดแคปซูลและเม็ด: Cilag AG
Schaffhausen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท Jenzen-Zeeแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 5 มีนาคม 2567
(USPI version MAY-2024 + CCDS V.21-AUG-2020
(Hep E Infectionin W&P) + GLOW /CAPTIVATE
(CCDS v.33, 10-Nov-2021) EU SmPC V Aug 2022
+ SHINE JP V.24 Feb 2023)

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ดำเนินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

