

ฉลากขวด

คำเตือน

- ยานี้ทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ที่กำลังมีอาการ หอบหืด โรคต่อหีน ต่อมลูกหมากโตหรือปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
- ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร

คำเตือน

ยานี้มีแอลกอฮอล์ (เอทานอล 95%) ผสมอยู่ 0.12% โดยปริมาตรต่อปริมาตร ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

สภาวะการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C



Reg.No.: 1A 115/67

Lot No.:

MFD.:

EXP.:

(ยาสิ้นอายุ)

60 ml



Alladinn

อาลาดีน



Syrup

Relief of allergic condition
Chlorpheniramine maleate 2 mg/5 mL



ผลิตโดย บริษัท วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี จำกัด
182 หมู่ 14 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่จิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม (73210) โทร.0-2420-1255

อาลาดีน

ยาอันตราย

ยาน้ำเชื่อมบรรเทาอาการแพ้ กลิ่นราสป์เบอร์รี่
ใน 1 ซ้อนชา (5 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย
คลอร์เฟนิรามีนมาเลอเตต 2 มิลลิกรัม

ขนาดและวิธีใช้ยา

เด็กอายุ 2 - 6 ปี:

รับประทาน ครั้งละ 1 มิลลิกรัม (ครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มิลลิลิตร ทุก 4 - 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 มิลลิกรัม (3 ซ้อนชา หรือ 15 มิลลิลิตร) ต่อวัน

เด็กอายุ 6 - 12 ปี:

รับประทาน ครั้งละ 2 มิลลิกรัม (1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร ทุก 4 - 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 มิลลิกรัม (6 ซ้อนชา หรือ 30 มิลลิลิตร) ต่อวัน

ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป:

รับประทาน ครั้งละ 4 มิลลิกรัม (2 ช้อนชา หรือ 10 มิลลิลิตร ทุก 4 - 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 มิลลิกรัม (12 ซ้อนชา หรือ 60 มิลลิลิตร) ต่อวัน

ยานี้มีส่วนผสมของวัตถุกันเสียและสารให้ความหวาน แทนน้ำตาล

ยานี้มีส่วนประกอบของสารให้ความหวานโซเดียมไซคลาเมต (Sodium cyclamate) หรือกรดไซคลามิก (cyclamic acid) ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่มีโซเดียมไซคลาเมตหรือกรดไซคลามิก [INS952/E952]

เป็นส่วนประกอบ

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร และหากกำลังใช้ยาอื่นอยู่ ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา