

คีโทโคนาโซล ความแรง 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คีโทโคนาโซล (ketoconazole) มีตัวยา 200 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเอโซลหรืออิมิดาโซล
- ห้ามใช้ในผู้มีปัญหาโรคตับ เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ
- เป็นโรคหัวใจที่อัตราการเต้นไม่สม่ำเสมอ
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
- หากท่านใช้ยาอื่นอยู่ เนื่องจากมียาหลายชนิดที่ห้ามใช้ร่วมกับยานี้
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- หญิงให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนม และอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ในทารกที่ดื่มนมได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตาม เพื่อช่วยให้ยาดูดซึมได้ดีขึ้น และลดอาการปวดมวนท้องจากยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 2 ชั่วโมงให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เวียนหัว ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วงรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ไม่ควรดื่มเหล้าระหว่างกินยานี้ และหลังจากหยุดกินยาแล้วอย่างน้อย 2 วัน เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ
- ถ้าต้องผ่าตัดใหญ่ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังกินยาคีโทโคนาโซลอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์สำหรับติดตามผลการรักษาบางประการจากการผ่าตัด
- หากต้องกินยาลดกรด ควรกินห่างจากยานี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะจะทำให้คีโทโคนาโซลถูกดูดซึมน้อยลง
- อาจทำให้ดวงตาของท่านไวต่อแสง อาจสวมแว่นตาตาเมื่อต้องอยู่ในที่มีแสงแดดหรือแสงไฟจ้า
- ยานี้อาจทำให้เวียนหัวหรือง่วงนอนแต่พบได้น้อยมาก ควรระมัดระวังการใช้ในกรณีที่ต้องทำงานซึ่งต้องใช้สมาธิ เช่น การขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง และถ้าท่านกินยาอื่นที่ทำให้ง่วงนอนด้วย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- หัวใจเต้นเร็วหรือผิปกติ
- บัสสาวะสีคล้ำขึ้นหรือเป็นสีน้ำตาล อุจจาระมีสีซีดเมื่ออาหาร ผิวหนังหรือตาเหลือง
- อ่อนเพลียผิปกติ มึนงง การมองเห็นผิดปกติ ตาไวต่อแสงมาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
- คัดเต้านม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร