

ชิทาฟล็อกซาซิน 50 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ชิทาฟล็อกซาซิน มีตัวยา 50 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน
- หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- เคยมีอาการเอ็นอักเสบ
- กำลังใช้ยาที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลง หรือมีผลต่อการเต้นของหัวใจ หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคลมชัก หรือเคยมีประวัติชัก
- มีภาวะซึมเศร้า หรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
- ไตทำงานผิดปกติ
- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มีปัญหาในการมองเห็น
- มีภาวะพร่องหรือขาดเอนไซม์จีซิกพีดี
- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” ตัวอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- หากต้องกินยานี้ร่วมกับยาลดกรด หรือยาที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กหรือสังกะสี ให้กินห่างจากยานี้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะยาเหล่านี้ส่งผลต่อฤทธิ์ของยา
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง
- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
- มีอาการชัก
- มีอาการซึมเศร้า มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
- มีอาการปวดบวม บริเวณเส้นเอ็น เอ็นร้อยหวาย
- การมองเห็นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- เวียนศีรษะ ปวดหัว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก