

# ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ ผสม อะมิโลไรด์ ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (hydrochlorothiazide) และ อะมิโลไรด์ (amiloride)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง
- ใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลว
- ใช้รักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมาน

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะโพแทสเซียมหรือแคลเซียมในเลือดสูง
- เป็นโรคไตวาย หรือมีภาวะปัสสาวะไม่ออก
- เป็นโรคตับวาย หรือโรคตับรุนแรง
- เป็นโรคแอดดิสัน ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ

### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหรือการทำงานของปอด
- มีประวัติการมองเห็นผิดปกติหรือปวดที่ดวงตา
- ดับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- โรคเบาหวาน
- โรคเกาต์
- โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (เอสแอลอี)
- สมดูลเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ

- เป็นหรือเคยเป็นภาวะเลือดเป็นกรด
- มีประวัติเป็นโรคกระดูกผุ
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดดโดยตรง

### ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

#### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอกหรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- มองเห็นลดลงผิดปกติ มีอาการเจ็บปวดที่ตารุนแรง
- ดับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- ผิวหนังหรือริมฝีปาก มีก้อนนูน ผื่นหรือแผลผิดปกติ
- หัวใจเต้นผิดปกติ จังหวะ ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- เวียนหัว รู้สึกบ้านหมุน ปวดหัว
- อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
- เบื่ออาหาร การรับรสผิดปกติ กระหายน้ำ ปากแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสำคัญ: ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ และ อะมิโลไรด์