

นิสแททิน  
ความแรง 100,000 หน่วย ต่อ  
มิลลิลิตร  
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า นิสแททิน (nystatin) มีตัวยา นิสแททิน 100,000 หน่วย ต่อ มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อราในปาก ล้าคอ และลำไส้ใหญ่
- ยานี้ใช้เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อราในปากที่ติดต่อมาจากแม่ในเด็กทารก

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- หญิงให้นมบุตรหรือวางแผนจะให้ทารก
- ติดเชื้อราในปอด หรือติดเชื้อราที่ผิวหนัง

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- เขย่าขวดก่อนรินยา
- ใช้หลอดหยดที่ติดมากับขวดยาดูดยาตามปริมาณที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำหยดยาใส่ในปาก
- ในกรณีที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราในปาก และลำคอ ให้อมกลั้วปากและกลืนยาอย่างช้าๆ เพื่อให้ยาอยู่ในปากและลำคือนานขึ้น

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องเสีย ท้องอืด ปวดเกร็งช่องท้อง อาหารไม่ย่อย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**