

**ลือโกโซโพรเฟน**  
**ความแรง 60 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่า ลือโกโซโพรเฟน (loxoprofen) เป็นยาในกลุ่มเอนเสด

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ใช้เพื่อบรรเทาปวดและอาการอักเสบที่เกิดจากการผ่าตัดหรือถอนฟัน
- ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเข่าเสื่อม

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ แพ้ยาในกลุ่มเอนเสด หรือ แอสไพริน
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- เลือดไหลแล้วหยุดยาก หรือกำลังเป็นโรคไข้เลือดออก
- เป็นโรคตับ โรคไต
- เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจรุนแรงหรือหัวใจวายรุนแรง
- มีแผลทะลุที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น มีเลือดออกในทางเดินอาหาร

**2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด
- อายุมากกว่า 60 ปี

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 กินยานี้อย่างไร**

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยาหลังอาหารทันที ไม่ควรกินยาขณะท้องว่าง

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้เลย

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา**

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสียหายให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมึนงงได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการมึนงง หรือมองเห็นผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน
  - เลือดออกในทางเดินอาหาร ปวดท้องรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ
  - บวมที่แขน ขา มือ ข้อเท้า เท้า
  - เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง**

- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง ท้องอืด แสบท้อง
  - ปวดหัว ท้องผูก ง่วงซึม
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าวางให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 2 ต.ค.2019

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**