

เอแทมบูทอล

ความแรง 200, 400, 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอแทมบูทอลไฮโดรคลอไรด์ (ethambutol hydrochloride) มีตัวยา 200, 400, 500 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อวัณโรค

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาวัณโรค

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีปัญหาทางสายตา หรือความสามารถในการมองเห็นผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่มีปัญหาทางสายตาหรือการมองเห็น ปัญหาเกี่ยวกับไต
- หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- ระมัดระวังเมื่อทำงานกับเครื่องจักร หรือขับชี่ยานพาหนะ
- ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
- หากมียาอื่นที่ใช้อยู่และไม่แน่ใจ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้วเต็มๆ
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเหลือเวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนถึงมือต่อไป ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- รีบนำยาไปปรึกษาแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - หายใจมีเสียงหวีด หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก และหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - มีการมองเห็นที่ผิดปกติ ได้แก่ มองเห็นไม้ขีด ปวดตา หรือตาบอดสี
 - มีภาวะตับอักเสบ เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง
 - มีรอยฟกช้ำ อุจจาระเป็นเลือด หรือสีผิวเปลี่ยน
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดและบวมตามข้อ
- มีอาการชาตามปลายประสาท กล้ามเนื้ออ่อนล้า
- มีอาการไม่สบายตัว มีไข้ ปวดหัว
- ปวดท้อง ถ่ายเหลว
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยา หรือหยิบยาออกจากขวดเมื่อจะกินยา ในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก