

ซูลิเดกไซด์ 250 หน่วย ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซูลิเดกไซด์ (sulodexide) มีตัวยา 250 หน่วย เป็นยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ป่วยที่แพ้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มเฮพาริน
- หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ห้ามกินพร้อมอาหาร

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชเมื่อลืมหากินยานี้มากกว่า 2 มื้อ

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
- หากใช้ยาแล้วยังมีอาการแย่ลงให้แจ้งแพทย์
- ห้ามหยุดกินยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงของภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด
- ควรตรวจวัดค่าแข็งตัวของเลือด ตามแพทย์นัด
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย

ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก