

โคลิโทรมาโซล
ความแรง 1 กรัม/100 กรัม
ชนิดครีม

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โคลิโทรมาโซล (clotrimazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา เช่น กลากเกลื้อน คันตามนิ้วมือนิ้วเท้า คันในร่มผ้า เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีไข้ ปวดท้องน้อย ปวดหลัง ตกขาวมีกลิ่น ผิดปกติ มีเลือดออกจากช่องคลอด

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับ
- วิธีใช้ทั่วไปที่แนะนำ: ทาบริเวณที่เป็นโรค ผิวน้ำวันละ 2-3 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ทายาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องทายาอีกครั้งไม่ต้องทายาที่ลืม แล้วทายาครั้งต่อไปตามปกติ

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือมีอาการกลับมาเป็นซ้ำ ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- หากใช้ยานี้แล้ว 7 วัน อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรอีกครั้ง
- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- รักษาสุขอนามัยบริเวณที่เป็นโรคให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำพุพอง มีไข้ **“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่ทายา
 - ผิวน้ำพุพอง คัน แสบร้อนที่ผิว เป็นแผลหรือผื่นแดงเล็กน้อย
 - ปวดท้อง
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 2ต.ค.2019