

กลิพิไซด์
ความแรง 5 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า กลิพิไซด์ (glipizide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- มีภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนในโรคเบาหวาน

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นๆ
- ดับ หรือ ใต้ ทำงานผิดปกติ
- ต่อมหมวกไต หรือ ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติ
- ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ มีประวัติบาดเจ็บรุนแรง มีไข้สูง หรือ มีภาวะติดเชื้อรุนแรง
- พร่องเอนไซม์จีซิกพีดี(G6PD) หรือโรคแพ้ถั่วปากอ้า
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนอาหาร 30 นาที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก หหมดสติ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างการใช้นี้
- หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแต่ยังรู้สึกตัวดี ให้กินลูกอมหรือน้ำหวานที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เพื่อแก้ไขในเบื้องต้น ถ้ามีอาการบอหรือรุนแรงควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอกหรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ดับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- น้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น เหงื่อออก เวียนหัว ปวดหัว หิวบ่อย อ่อนเพลีย
- คลื่นไส้
- ท้องเสีย
- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสำคัญ: กลิพิไซด์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566