

โทบราไมซินผสมเด็กซามาธาโซน
ความแรง 100 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
และ 300 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
ยาหยอดตา

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โทบราไมซิน (tobramycin) ผสมเด็กซามาธาโซน (dexamethasone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาการติดเชื้อของตาที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ร่วมกับมีอาการอักเสบของลูกตา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ตาอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส หรือ เชื้อรา

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคต่อหิน หรือ ต้อกระจก
- กระจกตาเป็นแผล
- ใส่คอนแทคเลนส์

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับ
- วิธีใช้ทั่วไปที่แนะนำ: หยอดตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1-2 หยด ทุก 4-6 ชั่วโมง
- เงยหน้า ตามองเพดาน ใช้มือดึงเปลือกตาให้เป็นถุงกระเปาะแล้วหยอดยาลงไป หลับตาแล้วกรอกลูกตาไปมาประมาณ 30-60 วินาที

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- หยอดตาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องหยอดครั้งต่อไป ไม่ต้องหยุดแล้วหยอดตาครั้งต่อไปตามปกติ
- ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณยาเพิ่มมากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการลืมใช้ยา

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ปลายหลอดหยดสัมผัสดวงตาหรือสิ่งใด ๆ ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน
- ยานี้อาจทำให้มองเห็นไม่ชัดชั่วคราว ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร หากมีอาการดังกล่าว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
 - การได้ยินผิดปกติ หรือ การได้ยินลดลง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- แสบหรือระคายเคืองตาเล็กน้อย
- มองเห็นไม่ชัด ชั่วคราว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้มีอายุ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 3ต.ค.2019

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**