

**พาราเซตามอลและออร์เฟนาดรีน**  
**ความแรง 450 มิลลิกรัม/35 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด/ชนิดเม็ดเคลือบ**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่า พาราเซตามอล (paracetamol) และ ออร์เฟนาดรีน (orphenadrine)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- เพื่อบรรเทาอาการปวดและคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นต่อหิน (ความดันในตาสูง)
- เป็นโรคต่อมลูกหมากโต หรือ กระเพาะปัสสาวะอุดตัน
- เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มีภาวะลำไส้อุดตัน

**2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาที่มีส่วนผสมของ "พาราเซตามอล"
- ดับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- เป็นโรคหัวใจ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจ
- หลงผิดหรือ หลงที่กำลั้งให้นมทารก

**"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 กินยานี้อย่างไร**

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ: กิน 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชยยาที่ลืมเด็ดขาด!!

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร**

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่ใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย เวียนหัวได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักรหากมีอาการดังกล่าว
- หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้อย่างไร
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาพาราเซตามอลหรือยาอื่นที่มียาพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง**

- ปากแห้ง คอแห้ง
- มองเห็นไม่ชัด มึนงง ง่วงซึม
- ใจสั่น ตื่นเต้น
- คลื่นไส้ ท้องผูก ไม่สบายท้อง
- ปัสสาวะลำบาก

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 28ก.ย.2019

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**