

ไมติคามัยซิน 200 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตร ชนิดยาผงผสมน้ำก่อนใช้

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าไมติคามัยซินแอสีเทต (midecamycin acetate) มีตัวยา 200 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตร เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียของทางเดินหายใจส่วนต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มแมคโครไลด์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร
- ผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่อง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาไซโคลสปอริน เออร์โกทามีน คาร์บามาเซพีน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- การผสมยาต้องใช้น้ำสุก หรือน้ำสะอาดที่เย็น ห้ามใช้น้ำร้อน
- ก่อนผสมน้ำควรเคาะผงยาในขวดให้ร่วน ไม่จับตัวกัน
- เติมน้ำครั้งแรก ประมาณครึ่ง ($\frac{1}{2}$) ถึงสองในสาม ($\frac{2}{3}$) ของขีดที่กำหนดข้างขวดยา หรือพอท่วมผงยา
- เขย่าให้ยากระจายตัวทั่ว ไม่มีก้อนแข็ง
- เติมน้ำให้ถึงขีดที่กำหนดข้างขวดยา เขย่าให้เข้ากันอีกครั้ง
- ยานี้กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอะไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไปห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย ปวดท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน อาการอักเสบของเยื่อเมือกในช่องปาก

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าวางโดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ผสมน้ำแล้วเก็บในตู้เย็นได้ 14 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก