

## ไพเรซีแทม

ความแรง 800 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบ

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไพเรซีแทม (piracetam)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อขาหรือแขน ที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ใช้เพื่อรักษาภาวะความจำเสื่อม สมองเสื่อม รวมถึงอาการเวียนหัว

### 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคไต การทำงานของไตบกพร่องรุนแรง
- ระบบประสาทสมองส่วนกลางเสื่อมจากความผิดปกติทางพันธุกรรม (โรคฮันติงตัน)
- เคยมีภาวะเลือดออกในสมอง

#### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ไตทำงานผิดปกติ การทำงานของไตบกพร่อง
- มีเลือดออกผิดปกติ หรือเคยมีภาวะเลือดออกผิดปกติมาก่อน
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ การหยุดยาเองอาจทำให้อาการของโรคกลับมากำเริบอีกครั้ง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา และผลจากการใช้ยา
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- เลือดออกผิดปกติ เลือดไหลไม่หยุด มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดำ
- ประสาทหลอน ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- มีนหัว ปวดหัว ง่วงซึม
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ไม่สบายท้อง
- น้ำหนักตัวเพิ่มผิดปกติ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 9 มิ.ย.2019