

โคลแฟสซิมิน 50 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้ชื่อว่าอะไร

ยานี้ชื่อ โคลแฟสซิมิน (clofazimine) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อมัยโคแบคทีเรีย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเรื้อน และอาการติดเชื้อชนิดอื่น ๆ ที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร
- มีปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะ หรือลำไส้
- กินยาพร้อมอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดท้อง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2. หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3. ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา ควรเก็บยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
- อุจจาระมีเลือดปน หรือ มีสีดำ
- รู้สึกซึมเศร้า คิดอยากทำร้ายตัวเอง

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผิวแห้งเป็นขุย คัน ถ้ามีอาการให้ทาครีมหรือโลชั่น
- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- ผิวหนังเปลี่ยนสีเป็นชมพู แดง หรือน้ำตาลเข้ม โดยสีผิวจะกลับเป็นเหมือนเดิมเมื่อหยุดกินยา แต่อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี
- เหนื่อ น้ำตา น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ หรือตาขาวเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือน้ำตาลเข้ม

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

<ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **< วัน เดือน ปี >**