

เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์
ความแรง 2.5 กรัม/100 กรัม,
และ 5 กรัม/100 กรัม
ชนิดเจล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ (benzoyl peroxide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เป็นยาใช้ภายนอกเพื่อ รักษาสิว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีบาดแผลบริเวณที่เป็นสิวยอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ หญิงที่ให้นมทารก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับ
- วิธีใช้ทั่วไปที่แนะนำ: ทายาบาง ๆ บริเวณที่เป็นสิว วันละ 1-2 ครั้ง หลังล้างหน้า หรือ ก่อนล้างหน้า 5-15 นาที

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องทายาที่ลืม แล้วทายาครั้งต่อไปตามปกติ
- ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณยาเพิ่มมากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการลืมใช้ยา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ เช่น เกิดอาการระคายเคืองรุนแรง แสบ แดง ผิวลอก เป็นต้น

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือเกิดอาการข้างเคียงจากยา ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- หลีกเลี่ยงการให้ยาสัมผัสดวงตา เปลือกตา ปากและเนื้อเยื่ออ่อน
- หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดโดยตรง หากเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้ยากันแดดและทายาในตอนเย็น หรือหากผิวไวแสงควรทายาก่อนนอน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคืองผิวบริเวณที่ทายา ปวด แสบ
- ผิวหนังแดง
- ผิวแห้ง ผิวลอก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 3ต.ค.2019

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**