

โทบราไมซิน
ความแรง 300 มิลลิกรัม/ 100 มิลลิลิตร
ชนิดยาหยอดตา

1.ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้ชื่อว่า โทบราไมซิน (tobramycin)
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- รักษาการติดเชื้อของตาที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้**
- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
 - หญิงอายุต่ำกว่า 1 ปี
 - กระจกตาเป็นแผล
 - ใส่คอนแทคเลนส์
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ยานี้ใช้อย่างไร**
- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับ
 - วิธีใช้ทั่วไปที่แนะนำ: หยอดตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1-2 หยด ทุก 4 ชั่วโมง
 - เงยหน้า ตามองเพดาน ใช้มือดึงเปลือกตาให้เป็นถุงกระเปาะแล้วหยอดตาลงไป หลับตาแล้วกรอกลูกตาไปมาประมาณ 30-60 วินาที
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- หยอดตาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องหยอดครั้งต่อไป ไม่ต้องหยอดแล้วหยอดตาครั้งต่อไปตามปกติ
 - ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณยาเพิ่มมากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการลืมใช้ยา

- 3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ปลายหลอดหยดสัมผัสดวงตาหรือสิ่งใด ๆ ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน
- ยานี้อาจทำให้มองเห็นไม่ชัดชั่วคราว ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรหากมีอาการดังกล่าว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
 - การได้ยินผิดปกติ หรือ การได้ยินลดลง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**
- แสบหรือระคายเคืองตาเล็กน้อย
 - มองเห็นไม่ชัด ชั่วคราว
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้มีอายุ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก