

**กริซีโอฟูลวิน  
125 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า กริ-ซี-โอ-ฟูล-วิน (griseofulvin)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้เพื่อรักษาเชื้อราที่ผิวหนัง ผมหงอก และเล็บ

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร
- ถ้าวางแผนจะมีบุตร ให้หยุดใช้ยาก่อน 1 เดือนสำหรับผู้หญิง และ 6 เดือนสำหรับผู้ชาย
- เป็นโรคตับรุนแรง
- เป็นโรคเลือดที่เรียกว่าพอร์ฟีเรีย
- เป็นโรคเอสแอลอี

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่ใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาคุมกำเนิด เฟนิลบิวตาไมน ฟิโนบาร์บิทอล วอร์ฟาริน และไซโคลสพอริน

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว หลังมื้ออาหารทันที

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ พร้อมอาหาร แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งโดยตรง หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิด ทาครีมกันแดด
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังเมื่อทำงานกับเครื่องจักร หรือขับขี่ยานพาหนะ

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- ภาวะตับอักเสบ เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง บัสสาวะสีเข้ม
- ใช้ ไม่สบายเนื้อตัว เจ็บคอ แผลในปาก ติดเชื้อซ้ำ
- ขาดตามปลายประสาท กล้ามเนื้ออ่อนล้า
- ปวดหัว มึนงง สับสน
- อาการทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง ถ่ายเหลว เมื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน การปรับรสเปลี่ยนไป

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**