

เทอร์บินาฟิน

ความแรง 250 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เทอร์บินาฟิน (terbinafine) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังและเล็บ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในกรณีเคยเป็นหรือปัจจุบันเป็นโรคตับเรื้อรัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีเป็นโรคสะเก็ดเงิน โรคเอสแอลอี มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด ภูมิคุ้มกันต่ำ ตั้งครรภ์หรือมีแผนจะตั้งครรภ์
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาและอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ไรแฟมพิซิน ไซเมทิดีน ยาด้านซึมเศร้า ยาด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไซโคลอสปอริน ฟลูโคนาโซล คีโตโคนาโซล เด็กชโพรเมโทรเฟน กาแฟ และช็อคโกแลต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ผื่น ปวดหัว เวียนหัวและบัสสาวะบ่อย ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมิจะนั้นเชื่อจะดีอย่า
- ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสง ควรทาครีมกันแดด
- ล้างมือบ่อยๆ เพราะยาอาจทำให้ติดเชื้อง่าย
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง หรืออุจจาระมีสีซีด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
- ผิวหนังช้ำ เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ติดเชื้อง่าย
- เวียนหัว บวมตามหน้าและคอ หน้าแดง ตะคริว เป็นไข้ ต่อมทอนซิลบวมโต
- ปวดท้องและหลังอย่างรุนแรง
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือบัสสาวะมีสีเข้ม (น้ำตาลแดง)

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- พฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนไปจากปกติ หรือซึมเศร้า
- การรับรสและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไป ปวดหัว คัดจมูก หรือน้ำมูกไหล

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก