

เซฟาเลกซิน

ความแรง 250 มิลลิกรัม, 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เซฟาเลกซิน (cephalexin) มีตัวยา เซฟาเลกซิน 250 มิลลิกรัม หรือ 500 มิลลิกรัม เป็น ยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน ปัสสาวะ ผิวหนัง หู และอื่นๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนิซิลิน
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์
- หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
- มีการทำงานของไตผิดปกติ
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น โพรเบนิดิซิด ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด (เช่น เมตฟอร์มิน) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น วอร์ฟาริน)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืม กิน ยาควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้ รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้า กิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่ รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่รุนแรง ปัสสาวะเป็นเลือด ให้รีบ นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของ แพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มีฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้อง ตรวจเลือดหรือปัสสาวะ เพราะยานี้อาจรบกวนผลการ ตรวจเลือดและปัสสาวะบางชนิด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องเสียรุนแรง มีมูกเลือดปน โดยอาจมีไข้ร่วมด้วย
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง แน่นท้อง
“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร