

**พราซิควอนเทล**  
**600 mg**  
**ชนิดเม็ด**

**1. ยานี้คือยาอะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าพราซิควอนเทล (praziquantel) มีตัวยา 600 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าพยาธิ

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ เช่น พยาธิใบไม้ในเลือด และพยาธิใบไม้ในตับ

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิที่ตา
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยา เด็กชาเมทาโซน ไรแฟมพิซิน เฟนิโทอิน และคาร์บามาเซพีน

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

**ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**

- เคยเกิดการชัก
- มีภาวะตับหรือไตทำงานบกพร่อง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาคลอโรควิน คีโโทโคนาโซล อิทราโคนาโซล เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้พร้อมอาหาร

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- หลีกเลี่ยงนมบุตรควรดื่มนมบุตรขณะกินยาและต่อเนื่องไปจนหลังหยุดยา 72 ชั่วโมง
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นผิดปกติจังหวะ
- ชัก

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย ผื่นคันเล็กน้อย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**