

ร็อกซิโทรมัยซิน

150 หรือ 300 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ร็อกซิโทรมัยซิน มีตัวยา 150 มิลลิกรัม หรือ 300 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มแมโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่มแมโครไลด์ เช่น อีริโทรมัยซิน อะซิโทรมัยซิน เป็นต้น
- มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือตับทำงานผิดปกติรุนแรง
- กำลังใช้ยารักษาโรคปวดหัวไมเกรนกลุ่มเออร์กอตอัลคาลอยด์ หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้ อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์
- หญิงให้นมบุตร
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” ตัวอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร 15 นาที หรือหลังอาหาร 3 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมิละนั้นเชื้อจะต้อยา
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี
- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ท้องเสียอย่างรุนแรง มีอาการขาดน้ำ เช่น ผิวแห้ง เหี่ยว ปากซีด เห็นอ้อยเพลี้ย หมดสด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มีฝ้าขาวในช่องปาก เจ็บที่ลิ้นและปาก
- มีอาการคันหรือเจ็บผิดปกติที่ช่องคลอด มีหนองไหล หรือตกขาวเปลี่ยนสีและมีกลิ่นผิดปกติ
- คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องอืด
- อยากอาหารลดลง การรับกลิ่นหรือรสเปลี่ยนไป
- ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**