

**เด็กซ์แลนโซพราโซล**  
**ความแรง 30, 60 มิลลิกรัม**  
**ชนิดแคปซูล**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่า เด็กซ์แลนโซพราโซล (dexlansoprazole)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร/ลำไส้เล็กส่วนต้น
- รักษาโรคกรดไหลย้อน หรือ ภาวะกรดเกิน
- รักษาภาวะหลอดอาหารอักเสบที่มีแผลจากกรดมา ทำลาย

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยากลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดตัวอื่น เช่น โอเมพราโซล แลนโซพราโซล

**2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ดับทำงานผิดปกติ หรือ เป็นโรคตับ
- เป็นโรคกระดูกพรุน
- ผิวหนังผิดปกติจากยาที่ยับยั้งกรดตัวอื่น
- มีภาวะวิตามินบี 12 ต่ำ
- ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมทารก

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 กินยานี้อย่างไร**

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยาทั้งแคปซูล ไม่เคี้ยว บด หรือ หักแคปซูล

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินครั้งต่อไป ไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา**

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
- ปรับพฤติกรรมการกินอาหารตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อผลการรักษาที่ดี

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ โดยมีอาการหัวใจเต้นเร็วหรือช้า ใจเต้นผิดปกติ หวหกล้ามเนื้อกระตุก หรือ ชัก

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- ปวดหัว เวียนหัว รู้สึกเหนื่อย
- ไม่สบายท้อง ท้องเสีย ท้องอืด
- คลื่นไส้อาเจียน

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 11มิ.ย.2019