

ซีฟิกซิม (Cefixime)
ความแรง 100 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
ยานี้มีชื่อว่า ซีฟิกซิม (cefixime) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเช่น ติดเชื้อที่หู จมูก ไซนัส ต่อมทอนซิล คอหอย ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาต้านเชื้อตัวอื่นในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเพนิซิลิน
- มีภาวะลำไส้อักเสบ (เช่น อาการท้องอืด ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น)
- มีการทำงานของไตผิดปกติ
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดบางชนิด (เช่น วอร์ฟาริน) เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้
ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกิน ยา ควรทำอย่างไร
ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย)]ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามิฉะนั้นเชื่อจะดื้อยา
- ระมัดระวังการขับถ่ายยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผิดปกติ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ท้องเสียต่อเนื่อง รุนแรง หรือ มีไข้

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
- มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง[ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ
<ปรับตามทะเบียนยา>
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 สิงหาคม 2561