

ฟอสโฟไมซิน

3 กรัม

ชนิดผงละลายน้ำสำหรับกิน

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
- ยานี้มีชื่อว่าฟอสโฟไมซินโทรเมตามอล (fosfomycin trometamol) มีตัวยา 3 กรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ หรือ ป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการสอดเครื่องมือหรือผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
  - เป็นโรคไตรุนแรง หรือ กำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
  - เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก
  - มีประวัติท้องร่วงรุนแรงจากการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
  - มีปัญหาการดูดซึมน้ำตาลบางชนิด เพราะยานี้มีส่วนประกอบของน้ำตาล
  - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาเมโทโคลพราไมด์ วัคซีนป้องกันโรคหิวฉวยชนิดกิน

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - กินยาตอนท้องว่าง โดยกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง *หรือ* กินหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
  - ผสมผงยา โดยเทลงในน้ำ 50 ถึง 75 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน แล้วกินยาทันที
- 3.2 หากลืมกิน ยาควรทำอะไร
- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- ให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อกำจัดยาส่วนเกิน
  - ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เดินเซ หูหมุนว มีสคล้ายมีโลหะในปาก การรับรสผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันครบทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมือนั้นเชื้อจะดี
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้หิวฉวยขึ้นได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
  - หัวใจเต้นเร็ว
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง
  - ปวดท้อง ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีไข้
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**
- 5.2อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
- ปวดหัว เวียนหัว
  - คลื่นไส้ อาทรรไม่ย่อย แสบยอดอก
  - คันในช่องคลอด
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**