

อะม็อกซิซิลลิน

ความแรง 875 มิลลิกรัม

กับ

คลาวูลานเนต ความแรง 125 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้เป็นยาสูตรผสมมีตัวยาชื่อ อะม็อกซิซิลลิน (amoxicillin) 875 มิลลิกรัม และคลาวูลานเนต (clavulanate) 125 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเพนิซิลลิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบผิวหนัง และภายในช่องปาก เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลลิน]
- การทำงานของตับผิดปกติจากการใช้ยานี้
- เคยเกิดภาวะดีซ่านจากการใช้ยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน
- หญิงมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- การทำงานของตับผิดปกติ
- การทำงานของไตผิดปกติ เพราะอาจทำให้เกิดอาการชักได้

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น อัลโลพูรินอล โพรเบนิซิด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น วอร์ฟาริน) เมโทเทรกเซต ไมโคฟีโนเลตโมฟิทีล ยาคุมกำเนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืม กิน ยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้า กิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อาการชัก อาการท้องเสียรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิบบกดี
- อุจจาระเป็นน้ำ มีมูกเลือดปน ปวดท้องรุนแรง และอาจมีไข้ร่วมด้วย
- มีอาการชัก
- มีอาการตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องร่วง คลื่นไส้อาเจียน
- มีแผลหรือฝ้าขาวในปาก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

<ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ