

เมโทโคลพราไมด์ ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร ชนิดน้ำเชื่อม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เมโทโคลพราไมด์ไฮโดรคลอไรด์ (metoclopramide hydrochloride)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
- ใช้ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่เกิดจากการได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
- มีภาวะลำไส้อุดตัน
- เป็นโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไตส่วนใน
- มีประวัติการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการใช้ยาบางชนิด
- เป็นโรคลมชัก
- เป็นโรคพาร์กินสัน
- ห้ามใช้ร่วมกับยา เลโวโดปา หรือยากกลุ่มกระตุ้นตัวรับโดปามีน

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หัวใจทำงานผิดปกติ หรือมีประวัติคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
- สมดุลเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ

- มีความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- หญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- หญิงให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ตลอดช่วงการให้นมลูก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กินยานี้แต่ละมื้อห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง แม้ว่าจะมีการอาเจียนหลังจากกินยา
- ไม่ควรกินยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ มึนงง ซึมลง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอกหรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
- ไข้สูง ชัก ซึมลง เหงื่อและน้ำลายไหลเยอะผิดปกติ
"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงซึม
- ซึมเศร้า กระสับกระส่าย ไม่มีแรง
- ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำเชื่อม
- ตัวยาสาคัญ: เมโทโคลพราไมด์ไฮโดรคลอไรด์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 สิงหาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร