

บรอมเฟนิรามีน 2 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

4 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาแก้แพ้ มีชื่อสามัญว่าบรอมเฟนิรามีนมาลีเอต (brompheniramine maleate)
- ใช้บรรเทาอาการต่างๆ จากการแพ้ เช่น เยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ ลมพิษ ใช้ร่วมกับอีพิเนฟรินหรือการรักษามาตรฐานอื่นๆ ในการรักษาแอนาฟิแล็กซิสและแอนาฟิแลกตอยด์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือเด็กซ์บรอมเฟนิรามีนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เพราะยากระตุ้นระบบประสาททำให้ชักได้
- ในผู้ที่กำลังใช้ยาหรือมีประวัติใช้ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ภายใน 14 วันที่ผ่านมา เพราะจะทำให้อาการข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้นได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น เช่น
 - โรคหืด โรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมพอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 - ความดันในลูกตาสูง โรคต้อหิน
 - ความดันเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
 - โรคลมชัก
 - ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ
 - โรคตับ
 - ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด หรือ ปัสสาวะคั่ง
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนคลอด เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
 - กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้และอาจลดการสร้างน้ำนม
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ • ยาทางจิตเวช เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ยานอนหลับ ยาคลายกังวล • ยาแก้ปวดบางชนิด • ยาต้านไวรัสเอดส์บางชนิด • ยาแก้ปวดบางชนิด • ยาแก้แพ้ชนิดอื่น ๆ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้จะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ถ้ากินยาแล้วปวดมวนท้องอาจกินยาพร้อมอาหารหรือนม

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ก่อนใช้ยานี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ยาอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของบรอมเฟนิรามีน มาลีเอต หรือยาแก้แพ้ชนิดอื่นอยู่ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาดได้
- ระมัดระวังในการขับขีเยียนยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้ง่วงซึม
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ง่วงซึมมากขึ้น
- ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะยานี้ทำให้ปากแห้ง เสมหะเหนียวขึ้น
- ถ้าต้องการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- อ่อนเพลียรุนแรง
- ง่วงซึมมากผิดปกติ
- สับสน กระสับกระส่าย ประสาทหลอน ชัก
- ตาพร่าหรือการมองเห็นผิดปกติ
- ใจสั่นผิดปกติ
- บั๊สสาวะลำบาก บั๊สสาวะน้อยลงผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น

- ง่วงซึม นอนไม่หลับ
- ปวดหัว เวียนหัว
- ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก หรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 14 เมษายน 2561

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร