

ไดโคลฟีแนก ชนิดเลททาผิวหนัง

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไดโคลฟีแนกไดเอทิลลามีน (Diclofenac diethylamine) เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ เอ็นเสด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบและบวมได้แก่
 - อาการปวดและอักเสบจากข้อเสื่อมที่มีอาการเล็กน้อยเช่น ปวดข้อขณะพัก ปวดข้อขณะเคลื่อนไหว ข้อบวม
 - อาการอักเสบบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อและข้อ จากเคล็ดขัดยอก ดึง หรือฟกช้ำ
 - อาการปวดอักเสบเฉพาะที่ของเอ็น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาไดโคลฟีแนกหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้หรือมีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยาในกลุ่มแอสไพรินหรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 6 เดือน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น เช่น เป็นหรือเคยมีประวัติเป็นโรคกระเพาะอาหาร
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - หญิงมีครรภ์ควรระวังการใช้ยานี้ในเดือนที่ 1-6

- หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากจำเป็นต้องใช้ ไม่ควรทาบริเวณเต้านม หรือทาในบริเวณที่กว้าง หรือใช้เป็นระยะเวลานาน
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น • ยาไดโคลฟีแนกรูปแบบอื่น • ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่นๆ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

วิธีใช้ยา

- ทายาวันละ 3-4 ครั้ง โดยทาบางๆ ให้ทั่วบริเวณที่มีอาการ แล้วนวดเบาๆ
- ควรล้างมือภายหลังจากทายานี้ ยกเว้นหากมีอาการที่มีมือ
- ห้ามทายานี้บริเวณผิวหนังที่มีแผลเปิดหรือฉีกขาด

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
หากมีการกินยานี้โดยไม่ตั้งใจ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

3.3 ถ้าลืมใช้ยานี้ ควรทำอย่างไร

หากลืมใช้ยานี้ ให้ทายาทันทีที่นึกได้ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดการทายา และทายาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการทายานี้เป็นบริเวณกว้างและใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ยกเว้นแพทย์สั่ง
- ยานี้ใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทาน

- ควรระวังอย่าให้ยานี้เข้าตาหรือสัมผัสเยื่อเมือกต่างๆ
- ไม่ใช่ยานี้เกิน 14 วัน ยกเว้นแพทย์สั่ง
- หากอาการปวด และบวมไม่ดีขึ้นใน 7 วัน ให้แจ้งแพทย์ทราบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หอบ
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ผิวหนังร้อนแดง ผิวหนังแพ้และอักเสบอย่างเฉียบพลัน

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที

- ผิวหนังไวต่อแสง โดยเกิดผื่นแดงเมื่อถูกแสง
- ผิวแห้ง ผื่นคันที่ไม่รุนแรง
- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อน หรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว
 - ไม่ต้องแช่แข็ง
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ

13 เมษายน 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร